

表 2095 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別（オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	18 (75.0)	2 (8.3)		4 (16.7)	24 (100.0)		3	27
0.4～ (%)	777 (93.3)	27 (3.2)		29 (3.5)	833 (100.0)		57	890
0.6～ (%)	6,496 (92.7)	301 (4.3)		212 (3.0)	7,009 (100.0)		433	7,442
0.8～ (%)	10,817 (92.2)	540 (4.6)		376 (3.2)	11,733 (100.0)	1	690	12,424
1.0～ (%)	4,751 (92.4)	221 (4.3)		170 (3.3)	5,142 (100.0)		298	5,440
1.2～ (%)	846 (92.2)	32 (3.5)		40 (4.4)	918 (100.0)		61	979
1.4～ (%)	90 (90.9)	5 (5.1)		4 (4.0)	99 (100.0)		7	106
1.6～ (%)	8 (88.9)	1 (11.1)			9 (100.0)			9
1.8～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
2.0～ (%)	3 (100.0)				3 (100.0)			3
合計 (%)	23,807 (92.4)	1,129 (4.4)		835 (3.2)	25,771 (100.0)	1	1,549	27,321
記載なし (%)	1,255 (84.7)	61 (4.1)		166 (11.2)	1,482 (100.0)		153	1,635
総計 (%)	25,062 (92.0)	1,190 (4.4)		1,001 (3.7)	27,253 (100.0)	1	1,702	28,956
平均	0.88	0.89		0.89	0.88	0.87	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.16		0.18	0.17		0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査