

表 2096 HDF希釈方法 %クレアチニン産生速度(%)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,075 (90.3)	53 (4.5)		63 (5.3)	1,191 (100.0)		61	1,252
60～ (%)	935 (91.0)	53 (5.2)		40 (3.9)	1,028 (100.0)		72	1,100
70～ (%)	1,698 (92.5)	70 (3.8)		68 (3.7)	1,836 (100.0)		117	1,953
80～ (%)	2,745 (92.1)	126 (4.2)		110 (3.7)	2,981 (100.0)	1	170	3,152
90～ (%)	3,693 (92.6)	167 (4.2)		130 (3.3)	3,990 (100.0)		222	4,212
100～ (%)	4,217 (92.2)	207 (4.5)		149 (3.3)	4,573 (100.0)		276	4,849
110～ (%)	3,992 (92.8)	198 (4.6)		114 (2.6)	4,304 (100.0)		268	4,572
120～ (%)	2,914 (93.7)	117 (3.8)		80 (2.6)	3,111 (100.0)		196	3,307
130～ (%)	1,575 (92.3)	83 (4.9)		49 (2.9)	1,707 (100.0)		99	1,806
140～ (%)	955 (91.7)	55 (5.3)		31 (3.0)	1,041 (100.0)		68	1,109
合計 (%)	23,799 (92.4)	1,129 (4.4)		834 (3.2)	25,762 (100.0)	1	1,549	27,312
記載なし (%)	1,263 (84.7)	61 (4.1)		167 (11.2)	1,491 (100.0)		153	1,644
総計 (%)	25,062 (92.0)	1,190 (4.4)		1,001 (3.7)	27,253 (100.0)	1	1,702	28,956
平均	102.74	103.17		98.36	102.62	84.20	103.13	102.65
標準偏差	23.46	24.13		25.53	23.58		23.60	23.58

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査