

表 2097 HDF希釈方法 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	6 (100.0)				6 (100.0)			6
1.5～ (%)	29 (80.6)	4 (11.1)		3 (8.3)	36 (100.0)		3	39
2.0～ (%)	167 (89.3)	11 (5.9)		9 (4.8)	187 (100.0)		10	197
2.5～ (%)	839 (89.5)	58 (6.2)		40 (4.3)	937 (100.0)		76	1,013
3.0～ (%)	6,158 (90.9)	327 (4.8)		287 (4.2)	6,772 (100.0)		386	7,158
3.5～ (%)	15,333 (92.7)	620 (3.7)		592 (3.6)	16,545 (100.0)		859	17,404
4.0～ (%)	5,408 (92.4)	227 (3.9)		217 (3.7)	5,852 (100.0)	1	302	6,155
4.5～ (%)	235 (90.0)	12 (4.6)		14 (5.4)	261 (100.0)		23	284
5.0～ (%)	14 (93.3)			1 (6.7)	15 (100.0)			15
合計 (%)	28,189 (92.1)	1,259 (4.1)		1,163 (3.8)	30,611 (100.0)	1	1,659	32,271
記載なし (%)	594 (76.3)	67 (8.6)		117 (15.0)	778 (100.0)		251	1,029
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	3.65	3.60		3.63	3.65	4.00	3.63	3.65
標準偏差	0.37	0.41		0.40	0.38		0.39	0.38

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査