

表 2098 HDF希釈方法 透析前CRP濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	15,668 (92.8)	651 (3.9)		570 (3.4)	16,889 (100.0)	1	815	17,705
0.2～ (%)	4,672 (91.7)	207 (4.1)		215 (4.2)	5,094 (100.0)		321	5,415
0.5～ (%)	2,258 (91.8)	91 (3.7)		110 (4.5)	2,459 (100.0)		165	2,624
1.0～ (%)	1,353 (89.4)	82 (5.4)		78 (5.2)	1,513 (100.0)		90	1,603
2.0～ (%)	720 (92.7)	34 (4.4)		23 (3.0)	777 (100.0)		81	858
4.0～ (%)	265 (94.0)	8 (2.8)		9 (3.2)	282 (100.0)		32	314
6.0～ (%)	108 (91.5)	7 (5.9)		3 (2.5)	118 (100.0)		13	131
8.0～ (%)	62 (95.4)	2 (3.1)		1 (1.5)	65 (100.0)		10	75
10.0～ (%)	65 (91.5)	3 (4.2)		3 (4.2)	71 (100.0)		10	81
15.0～ (%)	40 (88.9)	3 (6.7)		2 (4.4)	45 (100.0)		17	62
合計 (%)	25,211 (92.3)	1,088 (4.0)		1,014 (3.7)	27,313 (100.0)	1	1,554	28,868
記載なし (%)	3,572 (87.6)	238 (5.8)		266 (6.5)	4,076 (100.0)		356	4,432
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	0.49	0.56		0.51	0.49	0.09	1.04	0.52
標準偏差	1.47	1.79		1.51	1.49		3.85	1.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査