

表 2100 HDF希釈方法 透析前リン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析前リン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	732 (91.3)	29 (3.6)		41 (5.1)	802 (100.0)		58	860
3.0～ (%)	1,105 (91.5)	45 (3.7)		57 (4.7)	1,207 (100.0)		61	1,268
3.5～ (%)	2,013 (91.0)	98 (4.4)		100 (4.5)	2,211 (100.0)		116	2,327
4.0～ (%)	3,307 (92.1)	160 (4.5)		124 (3.5)	3,591 (100.0)		196	3,787
4.5～ (%)	4,157 (91.7)	200 (4.4)		174 (3.8)	4,531 (100.0)		236	4,767
5.0～ (%)	4,406 (92.0)	209 (4.4)		173 (3.6)	4,788 (100.0)		294	5,082
5.5～ (%)	3,879 (92.3)	167 (4.0)		157 (3.7)	4,203 (100.0)	1	262	4,466
6.0～ (%)	706 (91.2)	37 (4.8)		31 (4.0)	774 (100.0)		48	822
6.1～ (%)	2,394 (92.4)	105 (4.1)		92 (3.6)	2,591 (100.0)		160	2,751
6.5～ (%)	2,072 (91.9)	92 (4.1)		91 (4.0)	2,255 (100.0)		140	2,395
7.0～ (%)	1,334 (93.5)	41 (2.9)		51 (3.6)	1,426 (100.0)		75	1,501
7.5～ (%)	816 (92.6)	28 (3.2)		37 (4.2)	881 (100.0)		43	924
8.0～ (%)	513 (96.1)	12 (2.2)		9 (1.7)	534 (100.0)		23	557
8.5～ (%)	312 (93.4)	14 (4.2)		8 (2.4)	334 (100.0)		16	350
9.0～ (%)	482 (91.3)	24 (4.5)		22 (4.2)	528 (100.0)		34	562
合計 (%)	28,228 (92.1)	1,261 (4.1)		1,167 (3.8)	30,656 (100.0)	1	1,762	32,419
記載なし (%)	555 (75.7)	65 (8.9)		113 (15.4)	733 (100.0)		148	881
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	5.38	5.31		5.30	5.38	5.50	5.38	5.38
標準偏差	1.42	1.37		1.44	1.41		1.40	1.41

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査