

表 2104 HDF希釈方法 総コレステロール濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	688 (93.2)	25 (3.4)		25 (3.4)	738 (100.0)		37	775
100～ (%)	2,149 (92.7)	79 (3.4)		90 (3.9)	2,318 (100.0)		133	2,451
120～ (%)	4,103 (92.1)	181 (4.1)		171 (3.8)	4,455 (100.0)		280	4,735
140～ (%)	5,034 (91.9)	239 (4.4)		207 (3.8)	5,480 (100.0)		311	5,791
160～ (%)	4,429 (91.8)	220 (4.6)		177 (3.7)	4,826 (100.0)	1	261	5,088
180～ (%)	2,889 (91.7)	153 (4.9)		110 (3.5)	3,152 (100.0)		189	3,341
200～ (%)	1,654 (91.5)	89 (4.9)		65 (3.6)	1,808 (100.0)		127	1,935
220～ (%)	700 (91.3)	40 (5.2)		27 (3.5)	767 (100.0)		54	821
240～ (%)	284 (90.7)	19 (6.1)		10 (3.2)	313 (100.0)		19	332
260～ (%)	155 (89.1)	10 (5.7)		9 (5.2)	174 (100.0)		13	187
合計 (%)	22,085 (91.9)	1,055 (4.4)		891 (3.7)	24,031 (100.0)	1	1,424	25,456
記載なし (%)	6,698 (91.0)	271 (3.7)		389 (5.3)	7,358 (100.0)		486	7,844
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	158.39	162.50		158.17	158.56	174.00	160.15	158.65
標準偏差	35.55	36.07		35.95	35.60		36.42	35.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査