

表 2105 HDF希釈方法 HDL-C濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

HDL-C濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満	48	4		1	53		5	58
(%)	(90.6)	(7.5)		(1.9)	(100.0)			
20～	1,367	75		41	1,483		71	1,554
(%)	(92.2)	(5.1)		(2.8)	(100.0)			
30～	4,473	199		190	4,862		267	5,129
(%)	(92.0)	(4.1)		(3.9)	(100.0)			
40～	5,459	214		231	5,904	1	301	6,206
(%)	(92.5)	(3.6)		(3.9)	(100.0)			
50～	4,450	213		182	4,845		287	5,132
(%)	(91.8)	(4.4)		(3.8)	(100.0)			
60～	2,873	164		106	3,143		150	3,293
(%)	(91.4)	(5.2)		(3.4)	(100.0)			
70～	1,508	93		45	1,646		107	1,753
(%)	(91.6)	(5.7)		(2.7)	(100.0)			
80～	744	55		21	820		58	878
(%)	(90.7)	(6.7)		(2.6)	(100.0)			
90～	312	22		4	338		31	369
(%)	(92.3)	(6.5)		(1.2)	(100.0)			
100～	264	22		6	292		43	335
(%)	(90.4)	(7.5)		(2.1)	(100.0)			
合計	21,498	1,061		827	23,386	1	1,320	24,707
(%)	(91.9)	(4.5)		(3.5)	(100.0)			
記載なし	7,285	265		453	8,003		590	8,593
(%)	(91.0)	(3.3)		(5.7)	(100.0)			
総計	28,783	1,326		1,280	31,389	1	1,910	33,300
(%)	(91.7)	(4.2)		(4.1)	(100.0)			
平均	50.89	53.42		49.35	50.95	40.00	53.51	51.08
標準偏差	17.01	19.12		14.94	17.06		19.76	17.22

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査