

表 2106 HDF希釈方法 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

Non-HDL-C濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
50未満	391	12		14	417		25	442
(%)	(93.8)	(2.9)		(3.4)	(100.0)			
50～	1,707	78		74	1,859		147	2,006
(%)	(91.8)	(4.2)		(4.0)	(100.0)			
70～	3,739	181		150	4,070		255	4,325
(%)	(91.9)	(4.4)		(3.7)	(100.0)			
90～	4,619	227		173	5,019		266	5,285
(%)	(92.0)	(4.5)		(3.4)	(100.0)			
110～	3,816	205		147	4,168		233	4,401
(%)	(91.6)	(4.9)		(3.5)	(100.0)			
130～	2,337	127		80	2,544	1	133	2,678
(%)	(91.9)	(5.0)		(3.1)	(100.0)			
150～	1,175	67		51	1,293		82	1,375
(%)	(90.9)	(5.2)		(3.9)	(100.0)			
170～	500	37		17	554		35	589
(%)	(90.3)	(6.7)		(3.1)	(100.0)			
190～	206	9		6	221		14	235
(%)	(93.2)	(4.1)		(2.7)	(100.0)			
210～	103	4		2	109		3	112
(%)	(94.5)	(3.7)		(1.8)	(100.0)			
合計	18,593	947		714	20,254	1	1,193	21,448
(%)	(91.8)	(4.7)		(3.5)	(100.0)			
記載なし	10,190	379		566	11,135		717	11,852
(%)	(91.5)	(3.4)		(5.1)	(100.0)			
総計	28,783	1,326		1,280	31,389	1	1,910	33,300
(%)	(91.7)	(4.2)		(4.1)	(100.0)			
平均	107.41	110.15		106.11	107.49	134.00	105.68	107.39
標準偏差	33.37	33.21		33.46	33.37		34.03	33.41

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査