

表 2107 HDF希釈方法 透析前収縮期血圧(mmHg)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)				1 (100.0)	1 (100.0)			1
60～ (%)	67 (89.3)	2 (2.7)		6 (8.0)	75 (100.0)		6	81
80～ (%)	354 (88.5)	21 (5.3)		25 (6.3)	400 (100.0)		35	435
100～ (%)	1,870 (89.7)	108 (5.2)		107 (5.1)	2,085 (100.0)		129	2,214
120～ (%)	5,447 (91.6)	268 (4.5)		231 (3.9)	5,946 (100.0)		386	6,332
140～ (%)	8,472 (92.4)	349 (3.8)		343 (3.7)	9,164 (100.0)	1	540	9,705
160～ (%)	6,261 (92.3)	281 (4.1)		244 (3.6)	6,786 (100.0)		357	7,143
180～ (%)	2,362 (92.8)	90 (3.5)		92 (3.6)	2,544 (100.0)		139	2,683
200～ (%)	626 (93.7)	19 (2.8)		23 (3.4)	668 (100.0)		39	707
220～ (%)	159 (93.0)	7 (4.1)		5 (2.9)	171 (100.0)		8	179
合計 (%)	25,618 (92.0)	1,145 (4.1)		1,077 (3.9)	27,840 (100.0)	1	1,639	29,480
記載なし (%)	3,165 (89.2)	181 (5.1)		203 (5.7)	3,549 (100.0)		271	3,820
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	151.64	149.50		149.12	151.46	149.00	149.25	151.33
標準偏差	24.60	24.87		25.79	24.67		24.65	24.67

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査