

表 2131 1セッションあたりの置換液量(L) 原疾患別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

原疾患	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		41 (14.7)	92 (33.0)	106 (38.0)	4 (1.4)	36 (12.9)	279 (100.0)	8	287	10.14	6.51
慢性腎盂腎炎 (%)				2 (66.7)		1 (33.3)	3 (100.0)		3	16.67	11.55
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			1 (33.3)	2 (66.7)			3 (100.0)		3	9.33	1.15
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			2 (50.0)			2 (50.0)	4 (100.0)		4	14.50	8.85
その他の分類不能 の腎炎 (%)			2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)		6 (100.0)		6	9.67	3.67
多発性嚢胞腎 (%)		2 (11.1)	8 (44.4)	5 (27.8)		3 (16.7)	18 (100.0)	1	19	10.78	7.42
腎硬化症 (%)		4 (12.9)	13 (41.9)	9 (29.0)	1 (3.2)	4 (12.9)	31 (100.0)		31	10.26	6.94
悪性高血圧 (%)		1 (20.0)		2 (40.0)		2 (40.0)	5 (100.0)		5	14.80	8.90
糖尿病性腎症 (%)		28 (15.1)	73 (39.2)	55 (29.6)	7 (3.8)	23 (12.4)	186 (100.0)	5	191	9.89	6.43
SLE腎炎 (%)		3 (42.9)		4 (57.1)			7 (100.0)		7	7.43	3.21
アミロイド腎 (%)											
痛風腎 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
先天性代謝異常に よる腎不全 (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		1	20.00	
腎・尿路結核 (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	10.00	
腎・尿路結石 (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		1	24.00	
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
閉塞性尿路障害 (%)			1 (33.3)	2 (66.7)			3 (100.0)	1	4	8.67	2.31
骨髄腫 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
腎形成不全 (%)								1	1		
不明 (%)		7 (17.1)	19 (46.3)	12 (29.3)		3 (7.3)	41 (100.0)	2	43	8.44	5.95
再導入 (%)		1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	4 (44.4)	9 (100.0)		9	16.67	9.11
その他 (%)		2 (14.3)	5 (35.7)	3 (21.4)	1 (7.1)	3 (21.4)	14 (100.0)	1	15	11.71	8.58
合計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
記載なし (%)											
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査