

表 2134 1セッションあたりの置換液量(L) 血流量(ml/分)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

血流量	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)											
100～ (%)		1 (33.3)		1 (33.3)	1 (33.3)		3 (100.0)		3	9.67	6.51
120～ (%)			8 (100.0)				8 (100.0)		8	6.75	1.04
140～ (%)		19 (31.1)	25 (41.0)	14 (23.0)		3 (4.9)	61 (100.0)	2	63	6.59	5.06
160～ (%)			10 (43.5)	13 (56.5)			23 (100.0)		23	8.74	1.74
180～ (%)		11 (15.9)	33 (47.8)	17 (24.6)		8 (11.6)	69 (100.0)	2	71	9.26	5.95
200～ (%)		51 (20.2)	89 (35.2)	63 (24.9)	4 (1.6)	46 (18.2)	253 (100.0)	5	258	10.60	7.76
220～ (%)		5 (6.1)	22 (26.8)	37 (45.1)	6 (7.3)	12 (14.6)	82 (100.0)	2	84	11.54	5.98
240～ (%)		2 (2.1)	27 (28.7)	55 (58.5)	3 (3.2)	7 (7.4)	94 (100.0)	4	98	10.63	5.10
260～ (%)			2 (100.0)				2 (100.0)		2	7.00	1.41
280～ (%)			1 (33.3)	2 (66.7)			3 (100.0)	1	4	10.67	3.06
300～ (%)			2 (14.3)	5 (35.7)	1 (7.1)	6 (42.9)	14 (100.0)	1	15	15.50	7.09
350～ (%)				1 (50.0)		1 (50.0)	2 (100.0)		2	17.00	9.90
400～ (%)											
合計 (%)		89 (14.5)	219 (35.7)	208 (33.9)	15 (2.4)	83 (13.5)	614 (100.0)	17	631	10.18	6.65
記載なし (%)			1 (100.0)				1 (100.0)	2	3	8.00	
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		188.31	197.33	213.15	221.33	213.01	204.09	218.24	204.47		
標準偏差		25.73	33.97	36.63	42.74	35.54	35.60	47.07	35.98		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査