

表 2135 1セッションあたりの置換液量(L) 身長(cm)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

身長	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	8.00	2.83
130～ (%)											
135～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	7.50	3.54
140～ (%)		4 (14.8)	15 (55.6)	7 (25.9)		1 (3.7)	27 (100.0)		27	7.93	4.12
145～ (%)		7 (13.2)	25 (47.2)	14 (26.4)	2 (3.8)	5 (9.4)	53 (100.0)	2	55	9.72	6.06
150～ (%)		14 (14.9)	41 (43.6)	27 (28.7)	1 (1.1)	11 (11.7)	94 (100.0)	2	96	9.33	6.23
155～ (%)		15 (15.3)	34 (34.7)	32 (32.7)	3 (3.1)	14 (14.3)	98 (100.0)	3	101	10.42	6.97
160～ (%)		16 (14.4)	35 (31.5)	43 (38.7)		17 (15.3)	111 (100.0)	1	112	10.54	7.00
165～ (%)		17 (16.7)	29 (28.4)	33 (32.4)	4 (3.9)	19 (18.6)	102 (100.0)	3	105	11.12	7.59
170～ (%)		9 (11.8)	25 (32.9)	31 (40.8)	3 (3.9)	8 (10.5)	76 (100.0)	3	79	9.83	5.88
175～ (%)		2 (10.5)	5 (26.3)	8 (42.1)		4 (21.1)	19 (100.0)		19	11.95	7.47
180～ (%)			3 (37.5)	4 (50.0)	1 (12.5)		8 (100.0)	1	9	10.13	3.40
185～ (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	8.00	
190～ (%)											
合計 (%)		84 (14.2)	215 (36.3)	201 (33.9)	14 (2.4)	79 (13.3)	593 (100.0)	15	608	10.16	6.63
記載なし (%)		5 (22.7)	5 (22.7)	7 (31.8)	1 (4.5)	4 (18.2)	22 (100.0)	4	26	10.59	7.20
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		159.32	158.36	160.99	162.79	161.14	159.86	161.80	159.91		
標準偏差		8.55	10.02	9.64	10.05	8.06	9.51	10.93	9.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査