

表 2139 1セッションあたりの置換液量(L) Body Mass Index別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

Body Mass Index	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
14未満 (%)			3 (75.0)	1 (25.0)			4 (100.0)		4	7.50	1.91
14～ (%)		6 (22.2)	8 (29.6)	10 (37.0)		3 (11.1)	27 (100.0)		27	8.59	5.53
16～ (%)		8 (10.7)	33 (44.0)	25 (33.3)	2 (2.7)	7 (9.3)	75 (100.0)	5	80	9.51	5.36
18～ (%)		20 (13.4)	48 (32.2)	59 (39.6)	5 (3.4)	17 (11.4)	149 (100.0)	3	152	10.16	6.55
20～ (%)		15 (12.1)	48 (38.7)	38 (30.6)	3 (2.4)	20 (16.1)	124 (100.0)	3	127	10.75	7.25
22～ (%)		11 (12.1)	32 (35.2)	36 (39.6)	1 (1.1)	11 (12.1)	91 (100.0)		91	10.13	6.11
24～ (%)		14 (26.4)	18 (34.0)	11 (20.8)	1 (1.9)	9 (17.0)	53 (100.0)	2	55	9.72	7.52
26～ (%)		8 (22.2)	8 (22.2)	11 (30.6)	1 (2.8)	8 (22.2)	36 (100.0)		36	11.14	8.08
28～ (%)		2 (12.5)	8 (50.0)	3 (18.8)	1 (6.3)	2 (12.5)	16 (100.0)		16	10.06	7.07
30～ (%)			5 (45.5)	4 (36.4)		2 (18.2)	11 (100.0)		11	11.82	7.77
合計 (%)		84 (14.3)	211 (36.0)	198 (33.8)	14 (2.4)	79 (13.5)	586 (100.0)	13	599	10.16	6.66
記載なし (%)		5 (17.2)	9 (31.0)	10 (34.5)	1 (3.4)	4 (13.8)	29 (100.0)	6	35	10.59	6.41
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		21.44	21.01	20.77	21.23	21.76	21.10	19.71	21.07		
標準偏差		3.63	3.71	3.50	3.30	3.75	3.63	2.88	3.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査