

表 2140 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前BUN(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 前希釈）

| 透析前BUN      | 1未満 | 1～           | 5～            | 10～           | 15～         | 20～          | 合計             | 記載なし  | 総計    | 平均    | 標準偏差 |
|-------------|-----|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|------|
| 20未満<br>(%) |     |              |               | 1<br>(100.0)  |             |              | 1<br>(100.0)   |       | 1     | 10.00 |      |
| 20～<br>(%)  |     | 1<br>(9.1)   | 9<br>(81.8)   | 1<br>(9.1)    |             |              | 11<br>(100.0)  | 1     | 12    | 6.55  | 1.57 |
| 30～<br>(%)  |     |              | 12<br>(57.1)  | 5<br>(23.8)   |             | 4<br>(19.0)  | 21<br>(100.0)  | 1     | 22    | 11.05 | 6.12 |
| 40～<br>(%)  |     | 10<br>(14.7) | 22<br>(32.4)  | 26<br>(38.2)  | 1<br>(1.5)  | 9<br>(13.2)  | 68<br>(100.0)  |       | 68    | 10.13 | 6.51 |
| 50～<br>(%)  |     | 17<br>(12.0) | 48<br>(33.8)  | 54<br>(38.0)  | 4<br>(2.8)  | 19<br>(13.4) | 142<br>(100.0) | 3     | 145   | 10.61 | 6.69 |
| 60～<br>(%)  |     | 17<br>(11.6) | 52<br>(35.6)  | 46<br>(31.5)  | 6<br>(4.1)  | 25<br>(17.1) | 146<br>(100.0) | 6     | 152   | 10.95 | 6.86 |
| 70～<br>(%)  |     | 14<br>(15.7) | 37<br>(41.6)  | 29<br>(32.6)  |             | 9<br>(10.1)  | 89<br>(100.0)  | 2     | 91    | 9.39  | 5.93 |
| 80～<br>(%)  |     | 4<br>(10.5)  | 11<br>(28.9)  | 15<br>(39.5)  |             | 8<br>(21.1)  | 38<br>(100.0)  | 1     | 39    | 11.63 | 7.75 |
| 90～<br>(%)  |     | 5<br>(22.7)  | 5<br>(22.7)   | 11<br>(50.0)  | 1<br>(4.5)  |              | 22<br>(100.0)  | 1     | 23    | 8.36  | 3.65 |
| 100～<br>(%) |     | 2<br>(40.0)  | 1<br>(20.0)   | 2<br>(40.0)   |             |              | 5<br>(100.0)   |       | 5     | 6.20  | 3.90 |
| 110～<br>(%) |     |              |               | 1<br>(100.0)  |             |              | 1<br>(100.0)   |       | 1     | 10.00 |      |
| 120～<br>(%) |     |              |               |               |             |              |                |       |       |       |      |
| 合計<br>(%)   |     | 70<br>(12.9) | 197<br>(36.2) | 191<br>(35.1) | 12<br>(2.2) | 74<br>(13.6) | 544<br>(100.0) | 15    | 559   | 10.32 | 6.50 |
| 記載なし<br>(%) |     | 1<br>(25.0)  | 2<br>(50.0)   | 1<br>(25.0)   |             |              | 4<br>(100.0)   | 2     | 6     | 7.25  | 2.99 |
| 総計<br>(%)   |     | 71<br>(13.0) | 199<br>(36.3) | 192<br>(35.0) | 12<br>(2.2) | 74<br>(13.5) | 548<br>(100.0) | 17    | 565   | 10.29 | 6.49 |
| 平均          |     | 65.21        | 60.59         | 63.55         | 61.17       | 61.81        | 62.40          | 61.07 | 62.37 |       |      |
| 標準偏差        |     | 15.43        | 15.99         | 16.08         | 12.08       | 12.91        | 15.53          | 17.41 | 15.57 |       |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査