

表 2148 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析前補正 カルシウム濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		1	24.00	
7.0～ (%)		1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)		2	4.50	4.95
7.5～ (%)		3 (20.0)	1 (6.7)	9 (60.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	15 (100.0)	2	17	9.87	5.89
8.0～ (%)		6 (15.8)	10 (26.3)	15 (39.5)	1 (2.6)	6 (15.8)	38 (100.0)		38	10.47	6.78
8.4～ (%)		2 (16.7)	4 (33.3)	3 (25.0)		3 (25.0)	12 (100.0)		12	11.08	7.62
8.5～ (%)		14 (11.3)	49 (39.5)	38 (30.6)	2 (1.6)	21 (16.9)	124 (100.0)	4	128	10.77	7.35
9.0～ (%)		25 (15.1)	69 (41.6)	45 (27.1)	5 (3.0)	22 (13.3)	166 (100.0)	3	169	10.04	6.93
9.5～ (%)		21 (15.7)	44 (32.8)	49 (36.6)	2 (1.5)	18 (13.4)	134 (100.0)	4	138	10.17	6.61
10.0～ (%)		1 (5.9)	3 (17.6)	9 (52.9)	2 (11.8)	2 (11.8)	17 (100.0)		17	11.47	4.82
10.1～ (%)		6 (12.8)	22 (46.8)	13 (27.7)		6 (12.8)	47 (100.0)		47	9.74	5.98
10.5～ (%)		4 (17.4)	5 (21.7)	12 (52.2)	1 (4.3)	1 (4.3)	23 (100.0)	2	25	9.00	4.88
11.0～ (%)		3 (25.0)	4 (33.3)	3 (25.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	12 (100.0)		12	8.58	5.26
11.5～ (%)		1 (14.3)	2 (28.6)	4 (57.1)			7 (100.0)	1	8	8.00	2.58
12.0～ (%)		1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)		2	6.00	2.83
合計 (%)		88 (14.7)	215 (35.8)	200 (33.3)	15 (2.5)	82 (13.7)	600 (100.0)	16	616	10.18	6.66
記載なし (%)		1 (6.7)	5 (33.3)	8 (53.3)		1 (6.7)	15 (100.0)	3	18	10.00	5.89
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		9.39	9.35	9.35	9.39	9.19	9.33	9.38	9.34		
標準偏差		0.92	0.73	0.82	0.84	0.71	0.79	1.04	0.80		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査