

表 2149 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前リン濃度(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

透析前リン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)		5 (17.9)	16 (57.1)	5 (17.9)		2 (7.1)	28 (100.0)		28	8.21	5.86
3.0～ (%)		3 (12.5)	9 (37.5)	9 (37.5)	1 (4.2)	2 (8.3)	24 (100.0)	2	26	9.50	6.32
3.5～ (%)		4 (8.7)	19 (41.3)	15 (32.6)	2 (4.3)	6 (13.0)	46 (100.0)		46	10.35	6.30
4.0～ (%)		9 (12.3)	24 (32.9)	34 (46.6)		6 (8.2)	73 (100.0)	2	75	9.58	5.02
4.5～ (%)		7 (7.9)	34 (38.2)	29 (32.6)	2 (2.2)	17 (19.1)	89 (100.0)	1	90	11.58	7.35
5.0～ (%)		15 (16.3)	27 (29.3)	29 (31.5)	5 (5.4)	16 (17.4)	92 (100.0)	5	97	10.72	7.09
5.5～ (%)		15 (17.6)	34 (40.0)	23 (27.1)	1 (1.2)	12 (14.1)	85 (100.0)	1	86	10.02	6.86
6.0～ (%)		1 (9.1)	1 (9.1)	7 (63.6)		2 (18.2)	11 (100.0)		11	11.91	8.08
6.1～ (%)		8 (16.7)	19 (39.6)	17 (35.4)	1 (2.1)	3 (6.3)	48 (100.0)	3	51	8.67	5.20
6.5～ (%)		6 (15.4)	13 (33.3)	12 (30.8)	1 (2.6)	7 (17.9)	39 (100.0)	1	40	10.74	7.41
7.0～ (%)		4 (15.4)	9 (34.6)	6 (23.1)	1 (3.8)	6 (23.1)	26 (100.0)	1	27	11.96	8.53
7.5～ (%)		2 (12.5)	5 (31.3)	8 (50.0)		1 (6.3)	16 (100.0)		16	9.38	4.43
8.0～ (%)		3 (27.3)	4 (36.4)	3 (27.3)		1 (9.1)	11 (100.0)		11	8.27	6.36
8.5～ (%)		3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		5	4.20	3.70
9.0～ (%)		2 (14.3)		9 (64.3)	1 (7.1)	2 (14.3)	14 (100.0)		14	11.93	7.47
合計 (%)		87 (14.3)	215 (35.4)	207 (34.1)	15 (2.5)	83 (13.7)	607 (100.0)	16	623	10.23	6.66
記載なし (%)		2 (25.0)	5 (62.5)	1 (12.5)			8 (100.0)	3	11	6.25	2.96
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		5.50	5.07	5.39	5.49	5.38	5.29	5.21	5.29		
標準偏差		1.65	1.41	1.60	1.91	1.31	1.52	1.16	1.51		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査