

表 2153 1セッションあたりの置換液量(L) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

総コレステロール濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		5 (21.7)	8 (34.8)	5 (21.7)	2 (8.7)	3 (13.0)	23 (100.0)		23	10.00	7.82
100～ (%)		6 (10.2)	21 (35.6)	25 (42.4)	1 (1.7)	6 (10.2)	59 (100.0)	2	61	9.97	6.22
120～ (%)		21 (19.3)	33 (30.3)	41 (37.6)	4 (3.7)	10 (9.2)	109 (100.0)	2	111	9.37	6.09
140～ (%)		17 (15.9)	43 (40.2)	37 (34.6)	1 (0.9)	9 (8.4)	107 (100.0)		107	9.01	5.27
160～ (%)		17 (20.0)	29 (34.1)	31 (36.5)	2 (2.4)	6 (7.1)	85 (100.0)		85	9.08	5.53
180～ (%)		6 (11.5)	16 (30.8)	23 (44.2)		7 (13.5)	52 (100.0)		52	10.44	6.76
200～ (%)		9 (26.5)	10 (29.4)	10 (29.4)	1 (2.9)	4 (11.8)	34 (100.0)	2	36	9.65	7.54
220～ (%)		1 (10.0)	1 (10.0)	7 (70.0)	1 (10.0)		10 (100.0)	3	13	9.90	3.07
240～ (%)		1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)		5 (100.0)		5	9.00	4.24
260～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	9.00	1.41
合計 (%)		83 (17.1)	163 (33.5)	182 (37.4)	13 (2.7)	45 (9.3)	486 (100.0)	9	495	9.48	6.02
記載なし (%)		6 (4.7)	57 (44.2)	26 (20.2)	2 (1.6)	38 (29.5)	129 (100.0)	10	139	12.79	8.10
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		153.60	150.21	153.76	151.46	148.91	152.03	171.22	152.38		
標準偏差		34.29	32.77	37.38	50.15	36.44	35.57	55.74	36.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査