

表 2156 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析前収縮 期血圧	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)											
60～ (%)		1 (50.0)		1 (50.0)			2 (100.0)		2	7.00	4.24
80～ (%)		1 (6.3)	7 (43.8)	6 (37.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	16 (100.0)	1	17	9.88	4.99
100～ (%)		7 (13.2)	20 (37.7)	20 (37.7)	1 (1.9)	5 (9.4)	53 (100.0)		53	9.51	5.64
120～ (%)		14 (11.5)	49 (40.2)	50 (41.0)	2 (1.6)	7 (5.7)	122 (100.0)	1	123	9.19	5.05
140～ (%)		22 (13.0)	64 (37.9)	61 (36.1)	5 (3.0)	17 (10.1)	169 (100.0)	8	177	9.68	5.93
160～ (%)		18 (15.3)	43 (36.4)	42 (35.6)	1 (0.8)	14 (11.9)	118 (100.0)	2	120	9.84	6.23
180～ (%)		12 (21.8)	14 (25.5)	14 (25.5)	4 (7.3)	11 (20.0)	55 (100.0)		55	10.95	8.57
200～ (%)		8 (61.5)	3 (23.1)	1 (7.7)		1 (7.7)	13 (100.0)		13	5.85	7.08
220～ (%)		2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)			5 (100.0)		5	6.80	3.03
合計 (%)		85 (15.4)	201 (36.3)	197 (35.6)	14 (2.5)	56 (10.1)	553 (100.0)	12	565	9.59	6.10
記載なし (%)		4 (6.5)	19 (30.6)	11 (17.7)	1 (1.6)	27 (43.5)	62 (100.0)	7	69	15.35	8.77
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		157.88	146.30	145.91	151.14	155.32	148.98	147.75	148.95		
標準偏差		31.81	25.60	26.39	31.96	26.13	27.44	19.40	27.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査