表 2161　1セッションあたりの置換液量(L)　性別（オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

性別	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性		254	325	421	334	2,606	3,224	6,808	1,445	1,819	367	213	100	17,916	547	18,463	40.53	15.80
(%)		(1.4)	(1.8)	(2.3)	(1.9)	(14.5)	(18.0)	(38.0)	(8.1)	(10.2)	(2.0)	(1.2)	(0.6)	(100.0)				
女性		159	268	292	263	1,654	2,018	3,536	652	815	181	84	46	9,968	352	10,320	38.28	15.86
(%)		(1.6)	(2.7)	(2.9)	(2.6)	(16.6)	(20.2)	(35.5)	(6.5)	(8.2)	(1.8)	(0.8)	(0.5)	(100.0)				
合計		413	593	713	597	4,260	5,242	10,344	2,097	2,634	548	297	146	27,884	899	28,783	39.73	15.86
(%)		(1.5)	(2.1)	(2.6)	(2.1)	(15.3)	(18.8)	(37.1)	(7.5)	(9.4)	(2.0)	(1.1)	(0.5)	(100.0)				
記載なし																		
(%)																		
総計		413	593	713	597	4,260	5,242	10,344	2,097	2,634	548	297	146	27,884	899	28,783	39.73	15.86
(%)		(1.5)	(2.1)	(2.6)	(2.1)	(15.3)	(18.8)	(37.1)	(7.5)	(9.4)	(2.0)	(1.1)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査