

表 2165 1セッションあたりの置換液量(L) 糖尿病の既往別（オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

糖尿病の既往	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし (%)		84 (31.1)	322 (57.8)	312 (50.6)	295 (52.5)	2,013 (51.8)	2,576 (53.5)	5,325 (56.8)	1,263 (65.3)	1,424 (60.4)	314 (63.1)	161 (61.5)	68 (50.7)	14,157 (56.0)	307 (44.0)	14,464 (55.7)	40.76	15.52
既往あり (%)		186 (68.9)	235 (42.2)	305 (49.4)	267 (47.5)	1,873 (48.2)	2,242 (46.5)	4,043 (43.2)	672 (34.7)	932 (39.6)	184 (36.9)	101 (38.5)	66 (49.3)	11,106 (44.0)	391 (56.0)	11,497 (44.3)	38.62	15.80
合計 (%)		270 (100.0)	557 (100.0)	617 (100.0)	562 (100.0)	3,886 (100.0)	4,818 (100.0)	9,368 (100.0)	1,935 (100.0)	2,356 (100.0)	498 (100.0)	262 (100.0)	134 (100.0)	25,263 (100.0)	698 (100.0)	25,961 (100.0)	39.82	15.68
不明						1	13	6		9				29	3	32	44.69	12.33
記載なし		143	36	96	35	373	411	970	162	269	50	35	12	2,592	198	2,790	38.76	17.48
総計		413	593	713	597	4,260	5,242	10,344	2,097	2,634	548	297	146	27,884	899	28,783	39.73	15.86

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査