

表 2179 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

透析前アルブミン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)					2 (33.3)	1 (16.7)	3 (50.0)							6 (100.0)		6	24.83	8.38
1.5～ (%)			3 (11.1)	3 (11.1)	4 (14.8)	4 (14.8)	7 (25.9)	4 (14.8)	1 (3.7)	1 (3.7)				27 (100.0)	2	29	28.00	15.62
2.0～ (%)			9 (5.6)	9 (5.6)	17 (10.6)	39 (24.4)	31 (19.4)	41 (25.6)	4 (2.5)	8 (5.0)		1 (0.6)	1 (0.6)	160 (100.0)	7	167	31.19	15.32
2.5～ (%)		21 (2.6)	25 (3.1)	39 (4.8)	43 (5.3)	163 (20.1)	167 (20.6)	228 (28.2)	42 (5.2)	52 (6.4)	13 (1.6)	13 (1.6)	3 (0.4)	809 (100.0)	30	839	35.28	17.16
3.0～ (%)		98 (1.6)	138 (2.3)	193 (3.2)	171 (2.9)	925 (15.4)	1,187 (19.8)	2,048 (34.2)	417 (7.0)	582 (9.7)	113 (1.9)	90 (1.5)	32 (0.5)	5,994 (100.0)	164	6,158	39.17	16.48
3.5～ (%)		205 (1.4)	311 (2.1)	346 (2.3)	272 (1.8)	2,189 (14.6)	2,747 (18.4)	5,754 (38.5)	1,151 (7.7)	1,427 (9.5)	322 (2.2)	148 (1.0)	80 (0.5)	14,952 (100.0)	381	15,333	40.23	15.66
4.0～ (%)		85 (1.6)	98 (1.8)	110 (2.1)	78 (1.5)	834 (15.7)	995 (18.8)	2,013 (38.0)	439 (8.3)	494 (9.3)	91 (1.7)	36 (0.7)	28 (0.5)	5,301 (100.0)	107	5,408	39.74	15.29
4.5～ (%)		3 (1.3)	5 (2.2)	3 (1.3)	2 (0.9)	51 (22.9)	33 (14.8)	88 (39.5)	8 (3.6)	23 (10.3)	6 (2.7)	1 (0.4)		223 (100.0)	12	235	38.71	15.34
5.0～ (%)						5 (38.5)	2 (15.4)	4 (30.8)	1 (7.7)		1 (7.7)			13 (100.0)	1	14	37.08	14.01
合計 (%)		412 (1.5)	589 (2.1)	703 (2.6)	589 (2.1)	4,211 (15.3)	5,172 (18.8)	10,180 (37.0)	2,063 (7.5)	2,587 (9.4)	546 (2.0)	289 (1.1)	144 (0.5)	27,485 (100.0)	704	28,189	39.68	15.86
記載なし (%)		1 (0.3)	4 (1.0)	10 (2.5)	8 (2.0)	49 (12.3)	70 (17.5)	164 (41.1)	34 (8.5)	47 (11.8)	2 (0.5)	8 (2.0)	2 (0.5)	399 (100.0)	195	594	43.17	15.41
総計 (%)		413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86
平均		3.64	3.59	3.57	3.49	3.65	3.64	3.68	3.68	3.66	3.66	3.57	3.65	3.66	3.62	3.65		
標準偏差		0.39	0.42	0.42	0.48	0.40	0.38	0.35	0.34	0.35	0.33	0.36	0.33	0.37	0.41	0.37		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査