

表 2181 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析前補正 カルシウム濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		1 (0.9)	2 (1.8)	2 (1.8)		22 (19.8)	32 (28.8)	37 (33.3)	5 (4.5)	9 (8.1)	1 (0.9)			111 (100.0)	1	112	37.60	13.25
7.0～ (%)		6 (3.2)	3 (1.6)	4 (2.1)	8 (4.2)	32 (16.8)	45 (23.7)	67 (35.3)	7 (3.7)	14 (7.4)	3 (1.6)		1 (0.5)	190 (100.0)	7	197	36.82	15.29
7.5～ (%)		7 (1.0)	11 (1.6)	11 (1.6)	12 (1.8)	104 (15.2)	120 (17.5)	281 (41.0)	51 (7.4)	65 (9.5)	11 (1.6)	10 (1.5)	2 (0.3)	685 (100.0)	19	704	40.46	14.99
8.0～ (%)		24 (1.2)	45 (2.2)	67 (3.2)	40 (1.9)	318 (15.3)	413 (19.9)	768 (37.0)	158 (7.6)	180 (8.7)	32 (1.5)	18 (0.9)	11 (0.5)	2,074 (100.0)	37	2,111	39.25	15.51
8.4～ (%)		12 (2.0)	13 (2.2)	15 (2.5)	14 (2.4)	64 (10.8)	104 (17.6)	238 (40.2)	47 (7.9)	57 (9.6)	21 (3.5)	4 (0.7)	3 (0.5)	592 (100.0)	14	606	40.74	16.11
8.5～ (%)		99 (1.5)	157 (2.3)	149 (2.2)	144 (2.1)	1,004 (14.8)	1,250 (18.5)	2,599 (38.4)	509 (7.5)	621 (9.2)	134 (2.0)	62 (0.9)	41 (0.6)	6,769 (100.0)	186	6,955	39.88	15.76
9.0～ (%)		124 (1.5)	169 (2.0)	215 (2.6)	172 (2.1)	1,288 (15.5)	1,551 (18.7)	3,076 (37.0)	628 (7.6)	775 (9.3)	179 (2.2)	86 (1.0)	44 (0.5)	8,307 (100.0)	225	8,532	39.72	15.85
9.5～ (%)		91 (1.7)	105 (2.0)	156 (2.9)	119 (2.2)	786 (14.8)	976 (18.4)	1,915 (36.1)	423 (8.0)	544 (10.3)	109 (2.1)	56 (1.1)	26 (0.5)	5,306 (100.0)	147	5,453	39.86	16.10
10.0～ (%)		8 (1.3)	16 (2.6)	13 (2.1)	17 (2.8)	103 (16.8)	113 (18.4)	229 (37.4)	40 (6.5)	51 (8.3)	11 (1.8)	10 (1.6)	2 (0.3)	613 (100.0)	18	631	39.08	15.81
10.1～ (%)		23 (1.4)	43 (2.6)	42 (2.5)	33 (2.0)	273 (16.6)	303 (18.4)	578 (35.1)	117 (7.1)	165 (10.0)	32 (1.9)	26 (1.6)	13 (0.8)	1,648 (100.0)	29	1,677	39.70	16.62
10.5～ (%)		13 (1.6)	17 (2.2)	21 (2.7)	14 (1.8)	138 (17.5)	166 (21.0)	274 (34.7)	51 (6.5)	70 (8.9)	12 (1.5)	12 (1.5)	1 (0.1)	789 (100.0)	14	803	38.66	15.61
11.0～ (%)		3 (1.2)	6 (2.4)	3 (1.2)	8 (3.2)	50 (19.8)	52 (20.6)	82 (32.5)	19 (7.5)	25 (9.9)		4 (1.6)		252 (100.0)	5	257	38.05	15.28
11.5～ (%)		1 (1.2)	2 (2.3)	4 (4.7)	6 (7.0)	18 (20.9)	20 (23.3)	21 (24.4)	7 (8.1)	5 (5.8)	1 (1.2)	1 (1.2)		86 (100.0)	1	87	34.58	15.52
12.0～ (%)				1 (2.9)	2 (5.7)	6 (17.1)	7 (20.0)	12 (34.3)	1 (2.9)	6 (17.1)				35 (100.0)	1	36	38.40	14.18
合計 (%)		412 (1.5)	589 (2.1)	703 (2.6)	589 (2.1)	4,206 (15.3)	5,152 (18.8)	10,177 (37.1)	2,063 (7.5)	2,587 (9.4)	546 (2.0)	289 (1.1)	144 (0.5)	27,457 (100.0)	704	28,161	39.69	15.86
記載なし (%)		1 (0.2)	4 (0.9)	10 (2.3)	8 (1.9)	54 (12.6)	90 (21.1)	167 (39.1)	34 (8.0)	47 (11.0)	2 (0.5)	8 (1.9)	2 (0.5)	427 (100.0)	195	622	42.30	15.32
総計 (%)		413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86
平均		9.17	9.19	9.19	9.21	9.19	9.16	9.15	9.18	9.19	9.15	9.28	9.14	9.17	9.16	9.17		
標準偏差		0.71	0.72	0.71	0.75	0.76	0.77	0.72	0.70	0.73	0.63	0.73	0.61	0.73	0.66	0.73		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査