

表 2182 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前リン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析前リン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)		17 (2.4)	21 (2.9)	23 (3.2)	33 (4.6)	163 (22.8)	143 (20.0)	210 (29.3)	35 (4.9)	48 (6.7)	13 (1.8)	8 (1.1)	2 (0.3)	716 (100.0)	16	732	35.46	16.41
3.0～ (%)		31 (2.9)	16 (1.5)	23 (2.1)	37 (3.4)	200 (18.5)	205 (18.9)	374 (34.6)	71 (6.6)	80 (7.4)	26 (2.4)	12 (1.1)	7 (0.6)	1,082 (100.0)	23	1,105	38.21	16.54
3.5～ (%)		41 (2.1)	54 (2.7)	44 (2.2)	57 (2.9)	340 (17.3)	379 (19.3)	697 (35.5)	119 (6.1)	161 (8.2)	45 (2.3)	19 (1.0)	8 (0.4)	1,964 (100.0)	49	2,013	38.24	16.26
4.0～ (%)		59 (1.8)	70 (2.2)	77 (2.4)	88 (2.7)	492 (15.2)	618 (19.1)	1,171 (36.2)	246 (7.6)	305 (9.4)	64 (2.0)	25 (0.8)	18 (0.6)	3,233 (100.0)	74	3,307	39.24	15.90
4.5～ (%)		54 (1.3)	76 (1.9)	98 (2.4)	86 (2.1)	602 (14.8)	786 (19.4)	1,511 (37.2)	316 (7.8)	373 (9.2)	81 (2.0)	49 (1.2)	25 (0.6)	4,057 (100.0)	100	4,157	40.10	15.78
5.0～ (%)		74 (1.7)	99 (2.3)	94 (2.2)	85 (2.0)	640 (14.9)	795 (18.5)	1,583 (36.8)	328 (7.6)	453 (10.5)	86 (2.0)	45 (1.0)	18 (0.4)	4,300 (100.0)	106	4,406	39.96	15.88
5.5～ (%)		40 (1.1)	64 (1.7)	105 (2.8)	63 (1.7)	523 (13.9)	705 (18.7)	1,457 (38.6)	310 (8.2)	360 (9.5)	78 (2.1)	45 (1.2)	21 (0.6)	3,771 (100.0)	108	3,879	40.60	15.50
6.0～ (%)		9 (1.3)	18 (2.6)	24 (3.5)	7 (1.0)	104 (15.1)	138 (20.0)	248 (35.9)	41 (5.9)	75 (10.9)	16 (2.3)	7 (1.0)	4 (0.6)	691 (100.0)	15	706	39.83	16.21
6.1～ (%)		24 (1.0)	58 (2.5)	59 (2.5)	28 (1.2)	335 (14.4)	427 (18.4)	882 (38.0)	199 (8.6)	233 (10.0)	51 (2.2)	16 (0.7)	10 (0.4)	2,322 (100.0)	72	2,394	40.32	15.38
6.5～ (%)		21 (1.0)	36 (1.8)	45 (2.2)	39 (1.9)	320 (15.8)	394 (19.5)	764 (37.8)	149 (7.4)	188 (9.3)	31 (1.5)	25 (1.2)	10 (0.5)	2,022 (100.0)	50	2,072	39.92	15.35
7.0～ (%)		16 (1.2)	23 (1.8)	48 (3.7)	23 (1.8)	194 (15.0)	250 (19.3)	479 (37.0)	94 (7.3)	128 (9.9)	24 (1.9)	10 (0.8)	4 (0.3)	1,293 (100.0)	41	1,334	39.60	15.42
7.5～ (%)		12 (1.5)	21 (2.6)	31 (3.9)	14 (1.8)	110 (13.8)	122 (15.3)	325 (40.9)	53 (6.7)	76 (9.6)	9 (1.1)	13 (1.6)	9 (1.1)	795 (100.0)	21	816	40.15	16.97
8.0～ (%)		3 (0.6)	13 (2.6)	16 (3.2)	14 (2.8)	67 (13.3)	100 (19.9)	194 (38.6)	38 (7.6)	43 (8.5)	7 (1.4)	5 (1.0)	3 (0.6)	503 (100.0)	10	513	39.45	15.58
8.5～ (%)		3 (1.0)	9 (3.0)	5 (1.7)	7 (2.3)	48 (15.9)	53 (17.6)	109 (36.2)	24 (8.0)	26 (8.6)	8 (2.7)	5 (1.7)	4 (1.3)	301 (100.0)	11	312	40.67	16.96
9.0～ (%)		8 (1.7)	12 (2.5)	16 (3.4)	8 (1.7)	72 (15.3)	81 (17.2)	182 (38.6)	37 (7.9)	42 (8.9)	7 (1.5)	5 (1.1)	1 (0.2)	471 (100.0)	11	482	38.99	15.89
合計 (%)		412 (1.5)	590 (2.1)	708 (2.6)	589 (2.1)	4,210 (15.3)	5,196 (18.9)	10,186 (37.0)	2,060 (7.5)	2,591 (9.4)	546 (2.0)	289 (1.1)	144 (0.5)	27,521 (100.0)	707	28,228	39.67	15.86
記載なし (%)		1 (0.3)	3 (0.8)	5 (1.4)	8 (2.2)	50 (13.8)	46 (12.7)	158 (43.5)	37 (10.2)	43 (11.8)	2 (0.6)	8 (2.2)	2 (0.6)	363 (100.0)	192	555	43.97	15.20
総計 (%)		413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86
平均		5.06	5.36	5.50	5.07	5.30	5.35	5.43	5.44	5.43	5.27	5.45	5.44	5.38	5.46	5.38		
標準偏差		1.44	1.52	1.51	1.51	1.46	1.41	1.41	1.35	1.33	1.35	1.48	1.44	1.42	1.40	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査