

表 2189 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析前収縮期血圧	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)																		
60～ (%)		1 (1.6)	5 (7.8)	2 (3.1)		9 (14.1)	16 (25.0)	14 (21.9)	9 (14.1)	7 (10.9)		1 (1.6)		64 (100.0)	3	67	38.25	16.91
80～ (%)		4 (1.2)	8 (2.3)	10 (2.9)	12 (3.5)	61 (17.8)	81 (23.7)	97 (28.4)	22 (6.4)	33 (9.6)	8 (2.3)	2 (0.6)	4 (1.2)	342 (100.0)	12	354	38.49	16.59
100～ (%)		26 (1.4)	31 (1.7)	65 (3.6)	28 (1.5)	301 (16.5)	355 (19.5)	630 (34.6)	131 (7.2)	165 (9.1)	54 (3.0)	24 (1.3)	10 (0.5)	1,820 (100.0)	50	1,870	39.51	16.28
120～ (%)		72 (1.4)	141 (2.6)	136 (2.6)	111 (2.1)	825 (15.5)	1,049 (19.7)	1,822 (34.2)	429 (8.1)	528 (9.9)	118 (2.2)	63 (1.2)	30 (0.6)	5,324 (100.0)	123	5,447	39.64	16.22
140～ (%)		100 (1.2)	170 (2.1)	195 (2.4)	145 (1.8)	1,257 (15.2)	1,543 (18.7)	3,131 (37.9)	636 (7.7)	815 (9.9)	158 (1.9)	88 (1.1)	34 (0.4)	8,272 (100.0)	200	8,472	40.07	15.59
160～ (%)		81 (1.3)	143 (2.3)	138 (2.3)	126 (2.1)	1,041 (17.0)	1,121 (18.3)	2,228 (36.4)	449 (7.3)	587 (9.6)	126 (2.1)	52 (0.8)	36 (0.6)	6,128 (100.0)	133	6,261	39.59	15.96
180～ (%)		51 (2.2)	37 (1.6)	54 (2.3)	39 (1.7)	387 (16.8)	443 (19.2)	879 (38.2)	152 (6.6)	197 (8.6)	34 (1.5)	20 (0.9)	11 (0.5)	2,304 (100.0)	58	2,362	39.06	15.61
200～ (%)		8 (1.3)	16 (2.6)	14 (2.3)	17 (2.8)	105 (17.0)	129 (20.9)	208 (33.7)	47 (7.6)	57 (9.2)	8 (1.3)	8 (1.3)	1 (0.2)	618 (100.0)	8	626	38.86	15.67
220～ (%)		3 (2.0)	2 (1.3)	3 (2.0)	3 (2.0)	34 (22.7)	22 (14.7)	59 (39.3)	5 (3.3)	13 (8.7)	3 (2.0)	1 (0.7)	2 (1.3)	150 (100.0)	9	159	38.44	16.28
合計 (%)		346 (1.4)	553 (2.2)	617 (2.5)	481 (1.9)	4,020 (16.1)	4,759 (19.0)	9,068 (36.2)	1,880 (7.5)	2,402 (9.6)	509 (2.0)	259 (1.0)	128 (0.5)	25,022 (100.0)	596	25,618	39.66	15.90
記載なし (%)		67 (2.3)	40 (1.4)	96 (3.4)	116 (4.1)	240 (8.4)	483 (16.9)	1,276 (44.6)	217 (7.6)	232 (8.1)	39 (1.4)	38 (1.3)	18 (0.6)	2,862 (100.0)	303	3,165	40.30	15.50
総計 (%)		413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86
平均		153.91	149.83	149.15	151.65	152.40	150.88	152.58	150.49	151.07	148.71	149.40	150.34	151.66	151.07	151.64		
標準偏差		26.42	24.64	25.80	25.42	25.38	25.01	24.02	24.00	23.92	24.20	23.92	25.67	24.57	25.72	24.60		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査