

表 2194 1セッションあたりの置換液量(L) 併用の状況別（オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

併用の状況	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)		326 (8.1)	2,192 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,007 (100.0)	185	4,192	8.02	2.27
PD単独 (%)											
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)											
PD.HD併用週2 HD(F) (%)											
PD.HD併用週3 HD(F) (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
合計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査