

表 2196 1セッションあたりの置換液量(L) 年齢(歳)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

年齢	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)											
15歳～ (%)			7 (100.0)				7 (100.0)		7	6.43	1.13
30歳～ (%)		12 (5.9)	85 (42.1)	103 (51.0)	2 (1.0)		202 (100.0)	8	210	8.70	2.25
45歳～ (%)		56 (6.3)	451 (50.7)	379 (42.6)	2 (0.2)	2 (0.2)	890 (100.0)	49	939	8.32	2.27
60歳～ (%)		155 (8.0)	1,052 (54.1)	731 (37.6)	4 (0.2)	4 (0.2)	1,946 (100.0)	84	2,030	8.08	2.26
75歳～ (%)		100 (10.8)	573 (62.1)	246 (26.7)	3 (0.3)	1 (0.1)	923 (100.0)	42	965	7.50	2.19
90歳～ (%)		3 (7.9)	25 (65.8)	10 (26.3)			38 (100.0)	2	40	7.32	2.34
合計 (%)		326 (8.1)	2,193 (54.7)	1,469 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,006 (100.0)	185	4,191	8.02	2.27
不明 (%)			1 (33.3)	2 (66.7)			3 (100.0)		3	8.67	2.31
記載なし (%)											
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		68.34	66.74	63.68	64.18	68.57	65.74	65.51	65.73		
標準偏差		11.32	11.85	11.63	15.88	8.36	11.84	12.32	11.86		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査