

表 2203 1セッションあたりの置換液量(L) 身長(cm)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

身長	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)		1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		5	6.20	2.49
130～ (%)		1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)			6 (100.0)		6	6.67	2.07
135～ (%)		3 (7.7)	26 (66.7)	10 (25.6)			39 (100.0)	1	40	7.64	2.05
140～ (%)		21 (13.5)	93 (60.0)	40 (25.8)	1 (0.6)		155 (100.0)	5	160	7.37	2.22
145～ (%)		30 (8.5)	223 (63.5)	94 (26.8)	2 (0.6)	2 (0.6)	351 (100.0)	14	365	7.70	2.36
150～ (%)		61 (10.3)	336 (56.5)	194 (32.6)	3 (0.5)	1 (0.2)	595 (100.0)	27	622	7.77	2.39
155～ (%)		69 (11.0)	333 (52.9)	226 (35.9)	1 (0.2)		629 (100.0)	37	666	7.90	2.19
160～ (%)		48 (7.0)	375 (54.3)	264 (38.3)	1 (0.1)	2 (0.3)	690 (100.0)	28	718	8.11	2.22
165～ (%)		40 (6.2)	339 (52.4)	265 (41.0)	2 (0.3)	1 (0.2)	647 (100.0)	33	680	8.28	2.22
170～ (%)		21 (4.6)	232 (51.0)	200 (44.0)	1 (0.2)	1 (0.2)	455 (100.0)	16	471	8.48	2.29
175～ (%)		5 (2.8)	93 (51.7)	82 (45.6)			180 (100.0)	7	187	8.59	1.94
180～ (%)		3 (6.0)	19 (38.0)	28 (56.0)			50 (100.0)	1	51	8.78	2.24
185～ (%)			4 (40.0)	6 (60.0)			10 (100.0)		10	9.20	1.69
190～ (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	10.00	
合計 (%)		303 (7.9)	2,080 (54.6)	1,412 (37.0)	11 (0.3)	7 (0.2)	3,813 (100.0)	169	3,982	8.05	2.27
記載なし (%)		23 (11.7)	114 (58.2)	59 (30.1)			196 (100.0)	16	212	7.40	2.20
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		157.04	159.30	161.61	156.45	158.00	159.97	159.79	159.96		
標準偏差		9.27	9.80	9.56	9.91	10.08	9.77	8.57	9.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査