

表 2212 1セッションあたりの置換液量(L) nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

| nPCR         | 1未満 | 1～           | 5～              | 10～             | 15～        | 20～        | 合計               | 記載なし | 総計    | 平均    | 標準偏差 |
|--------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------------|------|-------|-------|------|
| 0.4未満<br>(%) |     | 1<br>(10.0)  | 8<br>(80.0)     | 1<br>(10.0)     |            |            | 10<br>(100.0)    |      | 10    | 6.20  | 1.99 |
| 0.4～<br>(%)  |     | 14<br>(10.6) | 86<br>(65.2)    | 32<br>(24.2)    |            |            | 132<br>(100.0)   | 8    | 140   | 7.42  | 1.98 |
| 0.6～<br>(%)  |     | 88<br>(8.9)  | 561<br>(56.9)   | 334<br>(33.9)   | 1<br>(0.1) | 2<br>(0.2) | 986<br>(100.0)   | 38   | 1,024 | 7.89  | 2.26 |
| 0.8～<br>(%)  |     | 100<br>(6.4) | 802<br>(51.5)   | 646<br>(41.5)   | 6<br>(0.4) | 2<br>(0.1) | 1,556<br>(100.0) | 63   | 1,619 | 8.26  | 2.24 |
| 1.0～<br>(%)  |     | 54<br>(7.6)  | 373<br>(52.7)   | 279<br>(39.4)   |            | 2<br>(0.3) | 708<br>(100.0)   | 37   | 745   | 8.14  | 2.26 |
| 1.2～<br>(%)  |     | 11<br>(8.3)  | 66<br>(50.0)    | 55<br>(41.7)    |            |            | 132<br>(100.0)   | 3    | 135   | 8.17  | 2.16 |
| 1.4～<br>(%)  |     | 1<br>(5.9)   | 9<br>(52.9)     | 7<br>(41.2)     |            |            | 17<br>(100.0)    | 1    | 18    | 8.18  | 2.19 |
| 1.6～<br>(%)  |     | 1<br>(33.3)  | 2<br>(66.7)     |                 |            |            | 3<br>(100.0)     |      | 3     | 6.00  | 2.00 |
| 1.8～<br>(%)  |     |              |                 |                 |            |            |                  |      |       |       |      |
| 2.0～<br>(%)  |     |              |                 | 2<br>(100.0)    |            |            | 2<br>(100.0)     |      | 2     | 11.00 | 1.41 |
| 合計<br>(%)    |     | 270<br>(7.6) | 1,907<br>(53.8) | 1,356<br>(38.2) | 7<br>(0.2) | 6<br>(0.2) | 3,546<br>(100.0) | 150  | 3,696 | 8.09  | 2.25 |
| 記載なし<br>(%)  |     | 21<br>(12.9) | 96<br>(58.9)    | 44<br>(27.0)    | 1<br>(0.6) | 1<br>(0.6) | 163<br>(100.0)   | 20   | 183   | 7.58  | 2.55 |
| 総計<br>(%)    |     | 291<br>(7.8) | 2,003<br>(54.0) | 1,400<br>(37.7) | 8<br>(0.2) | 7<br>(0.2) | 3,709<br>(100.0) | 170  | 3,879 | 8.07  | 2.26 |
| 平均           |     | 0.86         | 0.87            | 0.89            | 0.87       | 0.88       | 0.88             | 0.88 | 0.88  |       |      |
| 標準偏差         |     | 0.19         | 0.18            | 0.18            | 0.07       | 0.15       | 0.18             | 0.17 | 0.18  |       |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査