

表 2213 1セッションあたりの置換液量(L) %クレアチニン産生速度(%)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

%クレアチニン 産生速度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		30 (13.6)	130 (58.8)	58 (26.2)		3 (1.4)	221 (100.0)	5	226	7.53	2.77
60～ (%)		33 (16.7)	115 (58.1)	49 (24.7)	1 (0.5)		198 (100.0)	11	209	7.25	2.34
70～ (%)		27 (8.3)	187 (57.7)	110 (34.0)			324 (100.0)	14	338	7.80	2.13
80～ (%)		34 (7.7)	253 (57.1)	155 (35.0)	1 (0.2)		443 (100.0)	22	465	7.99	2.13
90～ (%)		39 (7.7)	279 (55.1)	186 (36.8)	1 (0.2)	1 (0.2)	506 (100.0)	29	535	8.06	2.38
100～ (%)		39 (6.0)	350 (54.2)	254 (39.3)	2 (0.3)	1 (0.2)	646 (100.0)	20	666	8.21	2.21
110～ (%)		30 (5.7)	251 (47.5)	246 (46.6)	1 (0.2)		528 (100.0)	15	543	8.41	2.00
120～ (%)		24 (6.6)	191 (52.3)	150 (41.1)			365 (100.0)	20	385	8.21	2.11
130～ (%)		8 (4.1)	96 (49.0)	90 (45.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	196 (100.0)	7	203	8.60	2.36
140～ (%)		6 (5.1)	55 (47.0)	56 (47.9)			117 (100.0)	7	124	8.49	1.98
合計 (%)		270 (7.6)	1,907 (53.8)	1,354 (38.2)	7 (0.2)	6 (0.2)	3,544 (100.0)	150	3,694	8.09	2.25
記載なし (%)		21 (12.7)	96 (58.2)	46 (27.9)	1 (0.6)	1 (0.6)	165 (100.0)	20	185	7.62	2.56
総計 (%)		291 (7.8)	2,003 (54.0)	1,400 (37.7)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,709 (100.0)	170	3,879	8.07	2.26
平均		90.78	97.56	102.82	101.50	78.88	99.03	99.40	99.04		
標準偏差		26.88	24.68	23.41	22.66	41.77	24.65	23.46	24.60		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査