

表 2217 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前リン濃度(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前リン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)		20 (11.7)	110 (64.3)	39 (22.8)	1 (0.6)	1 (0.6)	171 (100.0)	7	178	7.48	2.57
3.0～ (%)		17 (9.7)	89 (50.9)	67 (38.3)		2 (1.1)	175 (100.0)	13	188	8.06	2.97
3.5～ (%)		27 (8.5)	175 (55.2)	113 (35.6)	2 (0.6)		317 (100.0)	10	327	8.01	2.20
4.0～ (%)		40 (8.6)	254 (54.6)	167 (35.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	465 (100.0)	26	491	8.08	2.39
4.5～ (%)		45 (8.0)	305 (54.3)	211 (37.5)		1 (0.2)	562 (100.0)	16	578	8.00	2.18
5.0～ (%)		44 (7.0)	332 (53.1)	245 (39.2)	4 (0.6)		625 (100.0)	38	663	8.15	2.20
5.5～ (%)		27 (5.2)	299 (57.7)	191 (36.9)		1 (0.2)	518 (100.0)	20	538	8.14	2.13
6.0～ (%)		2 (2.6)	45 (57.7)	31 (39.7)			78 (100.0)	2	80	8.18	1.93
6.1～ (%)		21 (7.1)	168 (56.9)	105 (35.6)	1 (0.3)		295 (100.0)	12	307	7.97	2.06
6.5～ (%)		23 (8.9)	127 (49.0)	108 (41.7)	1 (0.4)		259 (100.0)	12	271	8.14	2.24
7.0～ (%)		15 (8.7)	91 (52.9)	66 (38.4)			172 (100.0)	6	178	7.97	2.28
7.5～ (%)		8 (7.4)	53 (49.1)	47 (43.5)			108 (100.0)	8	116	8.22	2.10
8.0～ (%)		3 (4.5)	43 (64.2)	21 (31.3)			67 (100.0)	1	68	7.94	1.91
8.5～ (%)		7 (14.0)	29 (58.0)	14 (28.0)			50 (100.0)	3	53	7.56	2.24
9.0～ (%)		11 (15.3)	32 (44.4)	29 (40.3)			72 (100.0)	4	76	8.03	2.69
合計 (%)		310 (7.9)	2,152 (54.7)	1,454 (37.0)	11 (0.3)	7 (0.2)	3,934 (100.0)	178	4,112	8.04	2.26
記載なし (%)		16 (21.3)	42 (56.0)	17 (22.7)			75 (100.0)	7	82	6.91	2.38
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		5.22	5.24	5.35	4.72	3.96	5.28	5.27	5.28		
標準偏差		1.76	1.51	1.45	1.13	1.04	1.51	1.59	1.51		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査