

表 2221 1セッションあたりの置換液量(L) 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

総コレステロール濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		15 (11.3)	75 (56.4)	41 (30.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	133 (100.0)	5	138	7.80	2.59
100～ (%)		27 (8.3)	182 (55.7)	117 (35.8)		1 (0.3)	327 (100.0)	15	342	7.85	2.48
120～ (%)		32 (5.5)	326 (56.3)	218 (37.7)	3 (0.5)		579 (100.0)	21	600	8.11	2.11
140～ (%)		44 (6.6)	373 (55.8)	245 (36.7)	3 (0.4)	3 (0.4)	668 (100.0)	37	705	8.13	2.34
160～ (%)		41 (7.2)	305 (53.7)	220 (38.7)	2 (0.4)		568 (100.0)	15	583	8.15	2.13
180～ (%)		28 (8.5)	170 (51.5)	132 (40.0)			330 (100.0)	15	345	8.00	2.21
200～ (%)		13 (6.5)	110 (54.7)	78 (38.8)			201 (100.0)	10	211	8.05	1.97
220～ (%)		3 (3.9)	39 (50.6)	35 (45.5)			77 (100.0)	4	81	8.36	1.90
240～ (%)		5 (13.2)	16 (42.1)	17 (44.7)			38 (100.0)	1	39	8.26	2.65
260～ (%)			6 (40.0)	9 (60.0)			15 (100.0)	2	17	9.07	1.98
合計 (%)		208 (7.1)	1,602 (54.6)	1,112 (37.9)	9 (0.3)	5 (0.2)	2,936 (100.0)	125	3,061	8.08	2.24
記載なし (%)		118 (11.0)	592 (55.2)	359 (33.5)	2 (0.2)	2 (0.2)	1,073 (100.0)	60	1,133	7.87	2.35
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		153.73	153.46	157.09	137.56	126.20	154.76	156.96	154.85		
標準偏差		36.61	34.94	36.51	24.87	29.33	35.69	36.41	35.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査