

表 2222 1セッションあたりの置換液量(L) HDL-C濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

HDL-C濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (5.9)	15 (88.2)	1 (5.9)			17 (100.0)	1	18	6.82	1.42
20～ (%)		18 (9.7)	100 (54.1)	67 (36.2)			185 (100.0)	8	193	7.87	2.35
30～ (%)		46 (7.5)	367 (59.8)	200 (32.6)		1 (0.2)	614 (100.0)	15	629	7.86	2.15
40～ (%)		44 (6.6)	376 (56.1)	249 (37.2)		1 (0.1)	670 (100.0)	31	701	8.06	2.15
50～ (%)		32 (6.7)	283 (59.0)	164 (34.2)		1 (0.2)	480 (100.0)	25	505	8.03	2.16
60～ (%)		12 (3.6)	180 (54.4)	138 (41.7)	1 (0.3)		331 (100.0)	13	344	8.41	2.07
70～ (%)		7 (4.5)	85 (54.5)	63 (40.4)	1 (0.6)		156 (100.0)	6	162	8.32	2.16
80～ (%)		1 (1.3)	33 (41.3)	46 (57.5)			80 (100.0)	2	82	8.75	1.99
90～ (%)		1 (2.6)	21 (53.8)	17 (43.6)			39 (100.0)	2	41	8.38	2.24
100～ (%)			20 (62.5)	12 (37.5)			32 (100.0)	2	34	8.38	1.48
合計 (%)		162 (6.2)	1,480 (56.8)	957 (36.8)	2 (0.1)	3 (0.1)	2,604 (100.0)	105	2,709	8.08	2.15
記載なし (%)		164 (11.7)	714 (50.8)	514 (36.6)	9 (0.6)	4 (0.3)	1,405 (100.0)	80	1,485	7.91	2.47
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		44.54	48.95	51.24	67.00	43.67	49.53	50.94	49.58		
標準偏差		13.77	17.18	17.73	7.07	13.20	17.26	17.68	17.28		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査