

表 2223 1セッションあたりの置換液量(L) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

Non-HDL-C濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)		4 (7.7)	29 (55.8)	19 (36.5)			52 (100.0)	3	55	7.87	2.43
50～ (%)		17 (7.0)	137 (56.4)	89 (36.6)			243 (100.0)	9	252	8.02	2.16
70～ (%)		28 (6.0)	268 (57.1)	171 (36.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	469 (100.0)	19	488	8.05	2.29
90～ (%)		31 (5.5)	329 (58.5)	201 (35.8)		1 (0.2)	562 (100.0)	30	592	8.03	2.09
110～ (%)		29 (6.7)	244 (56.0)	163 (37.4)			436 (100.0)	19	455	8.08	2.07
130～ (%)		23 (7.9)	143 (49.0)	126 (43.2)			292 (100.0)	12	304	8.16	2.21
150～ (%)		9 (7.3)	70 (56.9)	44 (35.8)			123 (100.0)	6	129	8.00	2.06
170～ (%)		4 (6.8)	34 (57.6)	21 (35.6)			59 (100.0)	3	62	7.95	2.13
190～ (%)		1 (6.7)	10 (66.7)	4 (26.7)			15 (100.0)		15	7.93	1.71
210～ (%)		1 (6.3)	5 (31.3)	10 (62.5)			16 (100.0)	1	17	9.00	2.19
合計 (%)		147 (6.5)	1,269 (56.0)	848 (37.4)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,267 (100.0)	102	2,369	8.06	2.15
記載なし (%)		179 (10.3)	925 (53.1)	623 (35.8)	10 (0.6)	5 (0.3)	1,742 (100.0)	83	1,825	7.97	2.41
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		107.14	104.62	106.73	73.00	87.00	105.54	106.22	105.57		
標準偏差		34.37	32.55	33.84		4.24	33.15	32.37	33.11		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査