

表 2224 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

| 透析前収縮<br>期血圧 | 1未満 | 1～           | 5～              | 10～             | 15～         | 20～        | 合計               | 記載なし   | 総計     | 平均   | 標準偏差 |
|--------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------------|--------|--------|------|------|
| 60未満<br>(%)  |     | 1<br>(100.0) |                 |                 |             |            | 1<br>(100.0)     |        | 1      | 4.00 |      |
| 60～<br>(%)   |     | 2<br>(10.5)  | 11<br>(57.9)    | 5<br>(26.3)     | 1<br>(5.3)  |            | 19<br>(100.0)    |        | 19     | 8.05 | 2.72 |
| 80～<br>(%)   |     | 7<br>(6.6)   | 69<br>(65.1)    | 29<br>(27.4)    |             | 1<br>(0.9) | 106<br>(100.0)   | 4      | 110    | 7.73 | 2.66 |
| 100～<br>(%)  |     | 31<br>(8.4)  | 205<br>(55.6)   | 130<br>(35.2)   | 2<br>(0.5)  | 1<br>(0.3) | 369<br>(100.0)   | 17     | 386    | 7.92 | 2.37 |
| 120～<br>(%)  |     | 59<br>(7.1)  | 454<br>(54.7)   | 312<br>(37.6)   | 4<br>(0.5)  | 1<br>(0.1) | 830<br>(100.0)   | 38     | 868    | 8.09 | 2.25 |
| 140～<br>(%)  |     | 66<br>(6.2)  | 575<br>(53.8)   | 423<br>(39.6)   | 2<br>(0.2)  | 2<br>(0.2) | 1,068<br>(100.0) | 37     | 1,105  | 8.18 | 2.24 |
| 160～<br>(%)  |     | 42<br>(6.3)  | 378<br>(56.6)   | 247<br>(37.0)   |             | 1<br>(0.1) | 668<br>(100.0)   | 26     | 694    | 8.09 | 2.12 |
| 180～<br>(%)  |     | 24<br>(8.3)  | 153<br>(52.9)   | 111<br>(38.4)   | 1<br>(0.3)  |            | 289<br>(100.0)   | 12     | 301    | 8.11 | 2.25 |
| 200～<br>(%)  |     | 7<br>(10.9)  | 42<br>(65.6)    | 15<br>(23.4)    |             |            | 64<br>(100.0)    | 5      | 69     | 7.38 | 2.31 |
| 220～<br>(%)  |     | 3<br>(13.6)  | 12<br>(54.5)    | 7<br>(31.8)     |             |            | 22<br>(100.0)    | 2      | 24     | 7.50 | 2.54 |
| 合計<br>(%)    |     | 242<br>(7.0) | 1,899<br>(55.3) | 1,279<br>(37.2) | 10<br>(0.3) | 6<br>(0.2) | 3,436<br>(100.0) | 141    | 3,577  | 8.07 | 2.26 |
| 記載なし<br>(%)  |     | 84<br>(14.7) | 295<br>(51.5)   | 192<br>(33.5)   | 1<br>(0.2)  | 1<br>(0.2) | 573<br>(100.0)   | 44     | 617    | 7.71 | 2.33 |
| 総計<br>(%)    |     | 326<br>(8.1) | 2,194<br>(54.7) | 1,471<br>(36.7) | 11<br>(0.3) | 7<br>(0.2) | 4,009<br>(100.0) | 185    | 4,194  | 8.02 | 2.27 |
| 平均           |     | 146.88       | 146.23          | 147.30          | 130.00      | 133.17     | 146.61           | 148.49 | 146.68 |      |      |
| 標準偏差         |     | 29.63        | 26.67           | 24.96           | 29.69       | 28.41      | 26.29            | 27.88  | 26.35  |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査