

表 2226 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前脈拍(拍/分)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析前脈拍	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			3 (100.0)				3 (100.0)		3	8.00	
40～ (%)		1 (5.9)	14 (82.4)	2 (11.8)			17 (100.0)		17	7.41	1.84
50～ (%)		16 (6.8)	141 (59.5)	78 (32.9)	1 (0.4)	1 (0.4)	237 (100.0)	11	248	7.90	2.33
60～ (%)		61 (7.4)	470 (56.8)	295 (35.6)	1 (0.1)	1 (0.1)	828 (100.0)	36	864	7.99	2.21
70～ (%)		77 (7.4)	571 (54.8)	385 (36.9)	6 (0.6)	3 (0.3)	1,042 (100.0)	45	1,087	8.10	2.42
80～ (%)		45 (7.0)	320 (49.9)	275 (42.9)	1 (0.2)		641 (100.0)	31	672	8.25	2.13
90～ (%)		19 (5.8)	173 (52.9)	134 (41.0)		1 (0.3)	327 (100.0)	15	342	8.26	2.18
100～ (%)		8 (6.2)	80 (62.0)	40 (31.0)	1 (0.8)		129 (100.0)	1	130	7.64	2.20
110～ (%)		5 (14.3)	23 (65.7)	7 (20.0)			35 (100.0)	2	37	7.57	2.42
120～ (%)		2 (13.3)	10 (66.7)	3 (20.0)			15 (100.0)		15	6.80	2.24
合計 (%)		234 (7.1)	1,805 (55.1)	1,219 (37.2)	10 (0.3)	6 (0.2)	3,274 (100.0)	141	3,415	8.07	2.27
記載なし (%)		92 (12.5)	389 (52.9)	252 (34.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	735 (100.0)	44	779	7.79	2.26
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		76.36	75.50	76.21	74.80	71.17	75.82	75.26	75.79		
標準偏差		14.82	13.94	12.39	12.58	10.72	13.44	12.10	13.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査