

表 2236 1セッションあたりの置換液量(L) 透析時間(時間/回)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析時間	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3.0未満 (%)		1 (100.0)					1 (100.0)		1	4.00	
3.0～ (%)		3 (2.8)	59 (55.7)	35 (33.0)	6 (5.7)	3 (2.8)	106 (100.0)	2	108	8.67	4.09
3.5～ (%)		9 (9.0)	58 (58.0)	22 (22.0)	2 (2.0)	9 (9.0)	100 (100.0)		100	9.10	4.92
4.0～ (%)		65 (7.7)	302 (36.0)	332 (39.5)	39 (4.6)	102 (12.1)	840 (100.0)	18	858	10.42	4.97
4.5～ (%)		5 (4.1)	45 (36.9)	57 (46.7)	10 (8.2)	5 (4.1)	122 (100.0)	4	126	10.98	4.27
5.0～ (%)		2 (1.8)	12 (10.9)	42 (38.2)	39 (35.5)	15 (13.6)	110 (100.0)	2	112	14.10	4.98
5.5～ (%)		2 (33.3)		3 (50.0)		1 (16.7)	6 (100.0)	1	7	10.33	6.02
6.0～ (%)				1 (14.3)	6 (85.7)		7 (100.0)		7	16.86	2.04
6.5～ (%)											
7.0～ (%)											
合計 (%)		87 (6.7)	476 (36.8)	492 (38.1)	102 (7.9)	135 (10.4)	1,292 (100.0)	27	1,319	10.57	5.00
記載なし (%)				3 (50.0)	2 (33.3)	1 (16.7)	6 (100.0)	1	7	13.83	4.49
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		3.98	3.89	4.07	4.50	4.11	4.04	4.14	4.04		
標準偏差		0.42	0.44	0.47	0.69	0.41	0.49	0.51	0.50		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査