

表 2238 1セッションあたりの置換液量(L) 身長(cm)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

身長	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)											
130～ (%)											
135～ (%)		2 (20.0)	7 (70.0)	1 (10.0)			10 (100.0)		10	6.40	2.88
140～ (%)		5 (15.2)	15 (45.5)	10 (30.3)	1 (3.0)	2 (6.1)	33 (100.0)	3	36	8.45	4.46
145～ (%)		13 (12.6)	45 (43.7)	30 (29.1)	5 (4.9)	10 (9.7)	103 (100.0)	5	108	9.35	4.95
150～ (%)		21 (11.7)	78 (43.6)	58 (32.4)	8 (4.5)	14 (7.8)	179 (100.0)	4	183	9.37	4.93
155～ (%)		16 (8.2)	75 (38.5)	78 (40.0)	15 (7.7)	11 (5.6)	195 (100.0)	6	201	9.87	4.31
160～ (%)		9 (3.5)	100 (39.4)	102 (40.2)	14 (5.5)	29 (11.4)	254 (100.0)	4	258	10.67	4.80
165～ (%)		11 (4.8)	67 (29.4)	106 (46.5)	18 (7.9)	26 (11.4)	228 (100.0)	1	229	11.03	4.70
170～ (%)		7 (4.2)	51 (30.4)	75 (44.6)	12 (7.1)	23 (13.7)	168 (100.0)	2	170	11.57	5.37
175～ (%)			17 (27.9)	22 (36.1)	10 (16.4)	12 (19.7)	61 (100.0)	2	63	13.02	4.97
180～ (%)		1 (6.7)	3 (20.0)	8 (53.3)	1 (6.7)	2 (13.3)	15 (100.0)		15	10.73	4.80
185～ (%)						2 (100.0)	2 (100.0)		2	20.00	
190～ (%)					1 (100.0)		1 (100.0)		1	15.00	
合計 (%)		85 (6.8)	458 (36.7)	490 (39.2)	85 (6.8)	131 (10.5)	1,249 (100.0)	27	1,276	10.48	4.92
記載なし (%)		2 (4.1)	18 (36.7)	5 (10.2)	19 (38.8)	5 (10.2)	49 (100.0)	1	50	13.27	6.36
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		156.04	159.38	162.13	163.67	163.45	160.95	156.07	160.85		
標準偏差		8.98	9.11	8.65	9.15	9.61	9.20	10.24	9.25		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査