

表 2240 1セッションあたりの置換液量(L) 体重減少量(kg)別（オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈）

体重減少量	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.0未満 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	8.00	
0.0～ (%)		5 (12.5)	18 (45.0)	13 (32.5)	2 (5.0)	2 (5.0)	40 (100.0)		40	9.13	5.38
1.0～ (%)		20 (8.2)	112 (45.9)	80 (32.8)	23 (9.4)	9 (3.7)	244 (100.0)	8	252	9.34	4.40
2.0～ (%)		44 (9.0)	186 (38.1)	185 (37.9)	34 (7.0)	39 (8.0)	488 (100.0)	12	500	10.12	4.79
3.0～ (%)		11 (4.4)	61 (24.5)	122 (49.0)	24 (9.6)	31 (12.4)	249 (100.0)	3	252	11.56	4.92
4.0～ (%)			18 (24.0)	32 (42.7)	7 (9.3)	18 (24.0)	75 (100.0)	2	77	13.16	5.47
5.0～ (%)			2 (11.8)	8 (47.1)	3 (17.6)	4 (23.5)	17 (100.0)		17	13.35	5.13
6.0～ (%)		1 (14.3)		1 (14.3)	2 (28.6)	3 (42.9)	7 (100.0)		7	15.00	7.66
7.0～ (%)											
8.0～ (%)											
合計 (%)		81 (7.2)	398 (35.5)	441 (39.3)	95 (8.5)	106 (9.5)	1,121 (100.0)	25	1,146	10.51	4.96
記載なし (%)			15 (34.1)	25 (56.8)	2 (4.5)	2 (4.5)	44 (100.0)		44	10.20	2.89
総計 (%)		81 (7.0)	413 (35.5)	466 (40.0)	97 (8.3)	108 (9.3)	1,165 (100.0)	25	1,190	10.50	4.90
平均		2.30	2.32	2.70	2.70	3.20	2.58	2.43	2.58		
標準偏差		0.81	0.89	0.95	1.14	1.15	1.00	0.97	0.99		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査