

表 2244 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈）

透析前クレアチニン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)			3 (75.0)	1 (25.0)			4 (100.0)		4	8.50	1.00
2～ (%)											
4～ (%)		4 (12.5)	17 (53.1)	10 (31.3)		1 (3.1)	32 (100.0)	1	33	7.81	3.55
6～ (%)		13 (11.7)	55 (49.5)	27 (24.3)	7 (6.3)	9 (8.1)	111 (100.0)	7	118	8.97	4.99
8～ (%)		23 (8.0)	110 (38.2)	101 (35.1)	21 (7.3)	33 (11.5)	288 (100.0)	6	294	10.43	5.15
10～ (%)		19 (5.8)	120 (36.7)	123 (37.6)	31 (9.5)	34 (10.4)	327 (100.0)	5	332	10.87	5.01
12～ (%)		13 (5.9)	58 (26.2)	107 (48.4)	23 (10.4)	20 (9.0)	221 (100.0)	3	224	11.13	4.87
14～ (%)		6 (5.9)	23 (22.5)	56 (54.9)	12 (11.8)	5 (4.9)	102 (100.0)	1	103	10.78	4.38
16～ (%)		3 (8.1)	12 (32.4)	15 (40.5)	1 (2.7)	6 (16.2)	37 (100.0)	2	39	11.11	5.31
合計 (%)		81 (7.2)	398 (35.5)	440 (39.2)	95 (8.5)	108 (9.6)	1,122 (100.0)	25	1,147	10.52	4.97
記載なし (%)			15 (34.9)	26 (60.5)	2 (4.7)		43 (100.0)		43	9.93	2.14
総計 (%)		81 (7.0)	413 (35.5)	466 (40.0)	97 (8.3)	108 (9.3)	1,165 (100.0)	25	1,190	10.50	4.90
平均		10.25	10.29	11.30	11.22	10.93	10.82	10.04	10.80		
標準偏差		2.92	2.74	2.56	2.22	2.52	2.66	3.08	2.67		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査