

表 2247 1セッションあたりの置換液量(L) nPCR(g/kg/day)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

nPCR	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			1 (50.0)		1 (50.0)		2 (100.0)		2	12.00	8.49
0.4～ (%)		3 (11.1)	13 (48.1)	8 (29.6)	1 (3.7)	2 (7.4)	27 (100.0)		27	9.52	5.09
0.6～ (%)		24 (8.1)	119 (40.3)	97 (32.9)	21 (7.1)	34 (11.5)	295 (100.0)	6	301	10.18	5.18
0.8～ (%)		37 (7.0)	185 (34.8)	210 (39.5)	45 (8.5)	54 (10.2)	531 (100.0)	9	540	10.72	5.10
1.0～ (%)		12 (5.6)	68 (31.5)	100 (46.3)	23 (10.6)	13 (6.0)	216 (100.0)	5	221	10.57	4.31
1.2～ (%)		2 (6.7)	8 (26.7)	17 (56.7)	3 (10.0)		30 (100.0)	2	32	10.10	3.00
1.4～ (%)				4 (80.0)		1 (20.0)	5 (100.0)		5	13.20	6.10
1.6～ (%)								1	1		
1.8～ (%)											
2.0～ (%)											
合計 (%)		78 (7.1)	394 (35.6)	436 (39.4)	94 (8.5)	104 (9.4)	1,106 (100.0)	23	1,129	10.52	4.94
記載なし (%)		3 (5.1)	19 (32.2)	30 (50.8)	3 (5.1)	4 (6.8)	59 (100.0)	2	61	10.25	4.17
総計 (%)		81 (7.0)	413 (35.5)	466 (40.0)	97 (8.3)	108 (9.3)	1,165 (100.0)	25	1,190	10.50	4.90
平均		0.87	0.86	0.91	0.90	0.85	0.88	0.97	0.89		
標準偏差		0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.16	0.26	0.16		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査