

表 2248 1セッションあたりの置換液量(L) %クレアチニン産生速度(%)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

%クレアチニン 産生速度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		5 (10.0)	31 (62.0)	12 (24.0)		2 (4.0)	50 (100.0)	3	53	7.90	3.38
60～ (%)		5 (10.0)	22 (44.0)	14 (28.0)	4 (8.0)	5 (10.0)	50 (100.0)	3	53	9.90	5.45
70～ (%)		3 (4.3)	26 (37.7)	28 (40.6)	7 (10.1)	5 (7.2)	69 (100.0)	1	70	10.28	4.75
80～ (%)		9 (7.4)	52 (43.0)	45 (37.2)	5 (4.1)	10 (8.3)	121 (100.0)	5	126	9.65	4.55
90～ (%)		16 (9.6)	60 (35.9)	56 (33.5)	16 (9.6)	19 (11.4)	167 (100.0)		167	10.59	5.52
100～ (%)		13 (6.3)	64 (31.2)	87 (42.4)	18 (8.8)	23 (11.2)	205 (100.0)	2	207	11.04	5.02
110～ (%)		11 (5.6)	64 (32.7)	87 (44.4)	16 (8.2)	18 (9.2)	196 (100.0)	2	198	10.72	4.65
120～ (%)		7 (6.1)	34 (29.6)	52 (45.2)	12 (10.4)	10 (8.7)	115 (100.0)	2	117	11.00	4.75
130～ (%)		7 (9.0)	18 (23.1)	35 (44.9)	10 (12.8)	8 (10.3)	78 (100.0)	5	83	11.19	5.46
140～ (%)		2 (3.6)	23 (41.8)	20 (36.4)	6 (10.9)	4 (7.3)	55 (100.0)		55	10.76	4.41
合計 (%)		78 (7.1)	394 (35.6)	436 (39.4)	94 (8.5)	104 (9.4)	1,106 (100.0)	23	1,129	10.52	4.94
記載なし (%)		3 (5.1)	19 (32.2)	30 (50.8)	3 (5.1)	4 (6.8)	59 (100.0)	2	61	10.25	4.17
総計 (%)		81 (7.0)	413 (35.5)	466 (40.0)	97 (8.3)	108 (9.3)	1,165 (100.0)	25	1,190	10.50	4.90
平均		100.06	99.60	105.86	108.97	104.26	103.34	95.02	103.17		
標準偏差		23.76	26.90	21.96	21.06	20.67	23.97	30.45	24.13		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査