

表 2250 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前CRP濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前CRP濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)		45 (7.0)	204 (31.8)	263 (41.0)	48 (7.5)	81 (12.6)	641 (100.0)	10	651	10.89	5.26
0.2～ (%)		19 (9.4)	71 (35.1)	77 (38.1)	14 (6.9)	21 (10.4)	202 (100.0)	5	207	10.36	5.18
0.5～ (%)		6 (6.8)	35 (39.8)	27 (30.7)	8 (9.1)	12 (13.6)	88 (100.0)	3	91	10.64	5.26
1.0～ (%)		9 (11.4)	27 (34.2)	27 (34.2)	3 (3.8)	13 (16.5)	79 (100.0)	3	82	10.33	5.75
2.0～ (%)		6 (18.2)	12 (36.4)	13 (39.4)	1 (3.0)	1 (3.0)	33 (100.0)	1	34	8.52	3.76
4.0～ (%)			3 (37.5)	3 (37.5)	2 (25.0)		8 (100.0)		8	10.75	3.73
6.0～ (%)		1 (14.3)	3 (42.9)	2 (28.6)	1 (14.3)		7 (100.0)		7	8.71	3.86
8.0～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	9.00	1.41
10.0～ (%)			2 (66.7)	1 (33.3)			3 (100.0)		3	8.67	1.15
15.0～ (%)			1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)	3 (100.0)		3	14.33	11.15
合計 (%)		86 (8.1)	359 (33.7)	415 (38.9)	77 (7.2)	129 (12.1)	1,066 (100.0)	22	1,088	10.64	5.24
記載なし (%)		1 (0.4)	117 (50.4)	80 (34.5)	27 (11.6)	7 (3.0)	232 (100.0)	6	238	10.31	3.73
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		0.59	0.64	0.48	0.46	0.58	0.56	0.55	0.56		
標準偏差		1.03	2.03	1.36	1.08	2.86	1.80	0.71	1.79		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査