

表 2251 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析前補正 カルシウム濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)			1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)		4 (100.0)		4	12.75	4.11
7.0～ (%)			2 (66.7)	1 (33.3)			3 (100.0)	1	4	9.33	0.58
7.5～ (%)		7 (21.9)	12 (37.5)	7 (21.9)	3 (9.4)	3 (9.4)	32 (100.0)	1	33	8.97	5.85
8.0～ (%)		8 (9.5)	20 (23.8)	42 (50.0)	8 (9.5)	6 (7.1)	84 (100.0)	1	85	10.49	4.70
8.4～ (%)			8 (33.3)	14 (58.3)	1 (4.2)	1 (4.2)	24 (100.0)	1	25	10.42	3.32
8.5～ (%)		21 (8.4)	102 (40.6)	93 (37.1)	12 (4.8)	23 (9.2)	251 (100.0)	6	257	9.88	4.79
9.0～ (%)		27 (7.0)	140 (36.3)	147 (38.1)	35 (9.1)	37 (9.6)	386 (100.0)	8	394	10.51	5.01
9.5～ (%)		13 (5.1)	95 (37.4)	85 (33.5)	25 (9.8)	36 (14.2)	254 (100.0)	7	261	11.27	5.26
10.0～ (%)			12 (35.3)	14 (41.2)	5 (14.7)	3 (8.8)	34 (100.0)		34	11.65	5.26
10.1～ (%)		8 (8.1)	35 (35.4)	38 (38.4)	5 (5.1)	13 (13.1)	99 (100.0)		99	10.38	5.06
10.5～ (%)		1 (2.3)	15 (34.9)	15 (34.9)	3 (7.0)	9 (20.9)	43 (100.0)		43	12.44	6.07
11.0～ (%)		1 (7.7)	2 (15.4)	7 (53.8)	1 (7.7)	2 (15.4)	13 (100.0)		13	11.54	5.88
11.5～ (%)		1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)		2	4.00	2.83
12.0～ (%)			1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)		3 (100.0)		3	12.33	5.86
合計 (%)		87 (7.1)	446 (36.2)	466 (37.8)	100 (8.1)	133 (10.8)	1,232 (100.0)	25	1,257	10.59	5.08
記載なし (%)			30 (45.5)	29 (43.9)	4 (6.1)	3 (4.5)	66 (100.0)	3	69	10.41	3.46
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		9.11	9.25	9.23	9.31	9.42	9.25	9.02	9.25		
標準偏差		0.79	0.73	0.76	0.77	0.71	0.75	0.61	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査