

表 2257 1セッションあたりの置換液量(L) HDL-C濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

HDL-C濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)			4 (100.0)		4	7.50	5.00
20～ (%)		13 (17.8)	31 (42.5)	22 (30.1)	3 (4.1)	4 (5.5)	73 (100.0)	2	75	8.90	5.06
30～ (%)		25 (12.6)	76 (38.4)	68 (34.3)	16 (8.1)	13 (6.6)	198 (100.0)	1	199	9.82	5.28
40～ (%)		15 (7.1)	77 (36.7)	78 (37.1)	22 (10.5)	18 (8.6)	210 (100.0)	4	214	10.56	5.25
50～ (%)		12 (5.7)	81 (38.8)	67 (32.1)	21 (10.0)	28 (13.4)	209 (100.0)	4	213	10.97	5.18
60～ (%)		5 (3.1)	55 (34.0)	60 (37.0)	15 (9.3)	27 (16.7)	162 (100.0)	2	164	11.70	4.97
70～ (%)		6 (6.5)	25 (26.9)	30 (32.3)	8 (8.6)	24 (25.8)	93 (100.0)		93	12.35	5.93
80～ (%)		3 (5.5)	16 (29.1)	23 (41.8)	2 (3.6)	11 (20.0)	55 (100.0)		55	11.65	5.54
90～ (%)			4 (19.0)	12 (57.1)	3 (14.3)	2 (9.5)	21 (100.0)	1	22	12.05	3.93
100～ (%)			7 (33.3)	12 (57.1)		2 (9.5)	21 (100.0)	1	22	10.57	3.64
合計 (%)		80 (7.6)	374 (35.8)	373 (35.7)	90 (8.6)	129 (12.3)	1,046 (100.0)	15	1,061	10.80	5.28
記載なし (%)		7 (2.8)	102 (40.5)	122 (48.4)	14 (5.6)	7 (2.8)	252 (100.0)	13	265	9.69	3.52
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		44.33	51.19	55.27	53.09	60.24	53.40	54.73	53.42		
標準偏差		16.37	18.42	20.33	15.98	17.49	19.05	24.41	19.12		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査