

表 2260 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前拡張 期血圧	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20～ (%)			3 (100.0)				3 (100.0)		3	7.00	1.73
40～ (%)		7 (7.4)	45 (47.4)	30 (31.6)	8 (8.4)	5 (5.3)	95 (100.0)	6	101	9.60	4.39
60～ (%)		46 (10.0)	161 (35.0)	148 (32.2)	45 (9.8)	60 (13.0)	460 (100.0)	12	472	10.73	5.51
80～ (%)		22 (7.7)	85 (29.6)	127 (44.3)	21 (7.3)	32 (11.1)	287 (100.0)	3	290	10.68	5.17
90～ (%)		2 (1.1)	50 (27.3)	86 (47.0)	20 (10.9)	25 (13.7)	183 (100.0)	3	186	11.79	4.70
100～ (%)		5 (6.0)	25 (29.8)	41 (48.8)	5 (6.0)	8 (9.5)	84 (100.0)	1	85	10.68	4.84
120～ (%)			2 (66.7)			1 (33.3)	3 (100.0)		3	11.33	7.57
140～ (%)					1 (100.0)		1 (100.0)		1	15.00	
合計 (%)		82 (7.3)	371 (33.2)	432 (38.7)	100 (9.0)	131 (11.7)	1,116 (100.0)	25	1,141	10.79	5.17
記載なし (%)		5 (2.7)	105 (57.7)	63 (34.6)	4 (2.2)	5 (2.7)	182 (100.0)	3	185	9.34	3.57
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		74.52	77.24	81.61	79.21	80.44	79.28	71.64	79.11		
標準偏差		13.54	15.18	14.16	16.48	13.45	14.76	15.75	14.82		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査