

表 2300 身長(cm) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	251 (0.1)	611 (0.3)	2,462 (1.1)	8,814 (4.0)	19,892 (9.0)	31,630 (14.3)	36,722 (16.6)	44,485 (20.1)	39,485 (17.9)	24,958 (11.3)	9,008 (4.1)	2,366 (1.1)	372 (0.2)	62 (0.0)	221,118 (100.0)	34,523	255,641	159.91	9.60
血液透析濾過 （％）	40 (0.1)	72 (0.2)	304 (0.8)	1,203 (3.1)	3,116 (8.1)	5,434 (14.2)	6,329 (16.5)	7,452 (19.4)	6,982 (18.2)	4,970 (13.0)	1,848 (4.8)	512 (1.3)	80 (0.2)	10 (0.0)	38,352 (100.0)	4,931	43,283	160.72	9.55
血液濾過 （％）	1 (1.1)	1 (1.1)		2 (2.3)	8 (9.2)	9 (10.3)	21 (24.1)	19 (21.8)	15 (17.2)	10 (11.5)	1 (1.1)				87 (100.0)	5	92	158.98	9.85
血液吸着透析 （％）		1 (0.1)	9 (0.6)	49 (3.2)	177 (11.6)	272 (17.9)	313 (20.6)	294 (19.3)	223 (14.7)	136 (8.9)	46 (3.0)	2 (0.1)			1,522 (100.0)	108	1,630	158.59	8.64
在宅血液透析 （％）				2 (0.5)	10 (2.7)	23 (6.2)	38 (10.2)	70 (18.8)	71 (19.0)	96 (25.7)	50 (13.4)	12 (3.2)		1 (0.3)	373 (100.0)	148	521	166.47	8.32
腹膜透析 （％）	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
合計 （％）	354 (0.1)	696 (0.3)	2,837 (1.1)	10,297 (3.8)	23,673 (8.8)	38,235 (14.3)	44,472 (16.6)	53,650 (20.0)	47,988 (17.9)	31,074 (11.6)	11,319 (4.2)	2,979 (1.1)	465 (0.2)	77 (0.0)	268,116 (100.0)	41,992	310,108	160.05	9.65
記載なし （％）																			
総計 （％）	354 (0.1)	696 (0.3)	2,837 (1.1)	10,297 (3.8)	23,673 (8.8)	38,235 (14.3)	44,472 (16.6)	53,650 (20.0)	47,988 (17.9)	31,074 (11.6)	11,319 (4.2)	2,979 (1.1)	465 (0.2)	77 (0.0)	268,116 (100.0)	41,992	310,108	160.05	9.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査