

表 2326 身長(cm) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	87	45	94	397	1,634	7,213	19,162	35,744	35,971	23,520	8,475	2,246	348	56	134,992	12,041	147,033	164.72	7.26
(%)	(0.1)	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(1.2)	(5.3)	(14.2)	(26.5)	(26.6)	(17.4)	(6.3)	(1.7)	(0.3)	(0.0)	(100.0)				
女性	150	523	2,211	7,886	17,185	22,801	15,695	6,514	1,605	307	74	8	3	1	74,963	6,975	81,938	151.34	6.89
(%)	(0.2)	(0.7)	(2.9)	(10.5)	(22.9)	(30.4)	(20.9)	(8.7)	(2.1)	(0.4)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	237	568	2,305	8,283	18,819	30,014	34,857	42,258	37,576	23,827	8,549	2,254	351	57	209,955	19,016	228,971	159.94	9.59
(%)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(3.9)	(9.0)	(14.3)	(16.6)	(20.1)	(17.9)	(11.3)	(4.1)	(1.1)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	237	568	2,305	8,283	18,819	30,014	34,857	42,258	37,576	23,827	8,549	2,254	351	57	209,955	19,016	228,971	159.94	9.59
(%)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(3.9)	(9.0)	(14.3)	(16.6)	(20.1)	(17.9)	(11.3)	(4.1)	(1.1)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査