

表 2337 身長(cm) 体重減少率(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	8 (0.2)	15 (0.4)	57 (1.7)	130 (3.8)	292 (8.6)	499 (14.6)	568 (16.6)	667 (19.5)	660 (19.3)	356 (10.4)	124 (3.6)	34 (1.0)	3 (0.1)	2 (0.1)	3,415 (100.0)	281	3,696	159.56	9.87
1.0～ (%)	13 (0.2)	21 (0.3)	76 (1.2)	257 (4.2)	606 (9.9)	895 (14.6)	1,048 (17.1)	1,244 (20.3)	1,041 (17.0)	652 (10.7)	202 (3.3)	55 (0.9)	7 (0.1)		6,117 (100.0)	492	6,609	159.29	9.56
2.0～ (%)	25 (0.2)	49 (0.3)	171 (1.1)	634 (4.0)	1,410 (8.9)	2,422 (15.3)	2,673 (16.9)	3,181 (20.1)	2,811 (17.7)	1,734 (10.9)	569 (3.6)	151 (1.0)	31 (0.2)	2 (0.0)	15,863 (100.0)	1,058	16,921	159.64	9.54
3.0～ (%)	33 (0.1)	64 (0.2)	337 (1.0)	1,217 (3.7)	2,857 (8.7)	4,676 (14.3)	5,370 (16.4)	6,647 (20.3)	5,913 (18.1)	3,766 (11.5)	1,383 (4.2)	368 (1.1)	51 (0.2)	6 (0.0)	32,688 (100.0)	1,896	34,584	160.14	9.50
4.0～ (%)	41 (0.1)	99 (0.2)	406 (0.9)	1,549 (3.5)	3,840 (8.7)	6,044 (13.8)	7,298 (16.6)	8,815 (20.1)	7,978 (18.2)	5,234 (11.9)	1,963 (4.5)	536 (1.2)	79 (0.2)	8 (0.0)	43,890 (100.0)	2,525	46,415	160.36	9.53
5.0～ (%)	25 (0.1)	78 (0.2)	348 (1.0)	1,259 (3.7)	2,979 (8.7)	4,902 (14.3)	5,718 (16.6)	6,960 (20.3)	6,223 (18.1)	4,035 (11.7)	1,388 (4.0)	362 (1.1)	54 (0.2)	12 (0.0)	34,343 (100.0)	1,946	36,289	160.15	9.45
6.0～ (%)	23 (0.1)	49 (0.3)	221 (1.3)	752 (4.3)	1,633 (9.4)	2,647 (15.2)	2,944 (16.9)	3,390 (19.5)	3,078 (17.7)	1,851 (10.6)	628 (3.6)	143 (0.8)	28 (0.2)	4 (0.0)	17,391 (100.0)	1,036	18,427	159.45	9.55
7.0～ (%)	14 (0.2)	22 (0.3)	78 (1.2)	324 (4.9)	776 (11.7)	1,028 (15.4)	1,150 (17.3)	1,259 (18.9)	1,071 (16.1)	644 (9.7)	233 (3.5)	56 (0.8)	4 (0.1)	1 (0.0)	6,660 (100.0)	448	7,108	158.69	9.77
8.0～ (%)	7 (0.3)	9 (0.4)	30 (1.5)	124 (6.0)	248 (12.0)	369 (17.9)	370 (17.9)	384 (18.6)	284 (13.8)	170 (8.2)	52 (2.5)	13 (0.6)	5 (0.2)		2,065 (100.0)	130	2,195	157.60	9.84
9.0～ (%)	1 (0.1)	6 (0.5)	19 (1.7)	65 (5.8)	153 (13.6)	205 (18.3)	203 (18.1)	185 (16.5)	160 (14.3)	84 (7.5)	33 (2.9)	7 (0.6)	1 (0.1)		1,122 (100.0)	83	1,205	157.34	9.74
合計 (%)	190 (0.1)	412 (0.3)	1,743 (1.1)	6,311 (3.9)	14,794 (9.0)	23,687 (14.5)	27,342 (16.7)	32,732 (20.0)	29,219 (17.9)	18,526 (11.3)	6,575 (4.0)	1,725 (1.1)	263 (0.2)	35 (0.0)	163,554 (100.0)	9,895	173,449	159.92	9.55
記載なし (%)	3 (0.1)	7 (0.3)	28 (1.2)	83 (3.6)	247 (10.7)	340 (14.7)	386 (16.6)	453 (19.5)	412 (17.8)	257 (11.1)	79 (3.4)	19 (0.8)	4 (0.2)	1 (0.0)	2,319 (100.0)	2,441	4,760	159.42	9.57
総計 (%)	193 (0.1)	419 (0.3)	1,771 (1.1)	6,394 (3.9)	15,041 (9.1)	24,027 (14.5)	27,728 (16.7)	33,185 (20.0)	29,631 (17.9)	18,783 (11.3)	6,654 (4.0)	1,744 (1.1)	267 (0.2)	36 (0.0)	165,873 (100.0)	12,336	178,209	159.92	9.55
平均	4.44	4.53	4.55	4.62	4.61	4.57	4.55	4.51	4.51	4.50	4.51	4.46	4.50	4.69	4.54	4.46	4.53		
標準偏差	1.97	1.87	1.81	1.76	1.73	1.70	1.66	1.61	1.61	1.55	1.53	1.48	1.47	1.53	1.64	1.76	1.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査