

表 2338 身長(cm) 体重減少率(%)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)	10 (0.5)	33 (1.5)	120 (5.5)	300 (13.8)	561 (25.8)	632 (29.1)	352 (16.2)	123 (5.7)	33 (1.5)	3 (0.1)	2 (0.1)	2,175 (100.0)	177	2,352	164.38	7.60
1.0～ (%)	4 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.1)	9 (0.2)	59 (1.5)	219 (5.7)	593 (15.4)	1,070 (27.8)	991 (25.7)	641 (16.6)	202 (5.2)	55 (1.4)	7 (0.2)		3,855 (100.0)	313	4,168	164.17	7.23
2.0～ (%)	12 (0.1)	4 (0.0)	8 (0.1)	38 (0.4)	114 (1.1)	531 (5.3)	1,462 (14.6)	2,685 (26.9)	2,687 (26.9)	1,713 (17.1)	560 (5.6)	151 (1.5)	31 (0.3)	2 (0.0)	9,998 (100.0)	633	10,631	164.51	7.29
3.0～ (%)	12 (0.1)	4 (0.0)	16 (0.1)	54 (0.3)	246 (1.2)	1,056 (5.0)	2,860 (13.7)	5,525 (26.4)	5,640 (27.0)	3,715 (17.8)	1,369 (6.5)	366 (1.7)	50 (0.2)	6 (0.0)	20,919 (100.0)	1,202	22,121	164.91	7.18
4.0～ (%)	21 (0.1)	12 (0.0)	15 (0.1)	58 (0.2)	310 (1.1)	1,334 (4.7)	3,854 (13.6)	7,368 (26.0)	7,608 (26.9)	5,166 (18.2)	1,950 (6.9)	536 (1.9)	78 (0.3)	8 (0.0)	28,318 (100.0)	1,539	29,857	165.10	7.23
5.0～ (%)	5 (0.0)	8 (0.0)	14 (0.1)	67 (0.3)	206 (0.9)	1,104 (5.0)	3,004 (13.7)	5,786 (26.4)	5,955 (27.2)	3,972 (18.1)	1,376 (6.3)	359 (1.6)	53 (0.2)	12 (0.1)	21,921 (100.0)	1,201	23,122	164.94	7.08
6.0～ (%)	5 (0.0)	2 (0.0)	12 (0.1)	46 (0.4)	148 (1.4)	591 (5.5)	1,526 (14.2)	2,839 (26.5)	2,933 (27.3)	1,827 (17.0)	624 (5.8)	143 (1.3)	28 (0.3)	4 (0.0)	10,728 (100.0)	612	11,340	164.53	7.16
7.0～ (%)	5 (0.1)	3 (0.1)	5 (0.1)	13 (0.3)	57 (1.5)	226 (5.9)	579 (15.1)	1,015 (26.4)	1,016 (26.4)	633 (16.5)	230 (6.0)	55 (1.4)	4 (0.1)	1 (0.0)	3,842 (100.0)	243	4,085	164.23	7.66
8.0～ (%)		1 (0.1)	2 (0.2)	5 (0.4)	18 (1.6)	82 (7.2)	200 (17.7)	313 (27.6)	272 (24.0)	170 (15.0)	52 (4.6)	13 (1.1)	5 (0.4)		1,133 (100.0)	63	1,196	163.61	7.29
9.0～ (%)		2 (0.3)		4 (0.6)	18 (2.9)	51 (8.3)	103 (16.7)	162 (26.2)	153 (24.8)	84 (13.6)	33 (5.3)	7 (1.1)	1 (0.2)		618 (100.0)	46	664	163.26	7.55
合計 (%)	67 (0.1)	38 (0.0)	78 (0.1)	304 (0.3)	1,209 (1.2)	5,314 (5.1)	14,481 (14.0)	27,324 (26.4)	27,887 (26.9)	18,273 (17.7)	6,519 (6.3)	1,718 (1.7)	260 (0.3)	35 (0.0)	103,507 (100.0)	6,029	109,536	164.80	7.22
記載なし (%)	1 (0.1)	1 (0.1)		6 (0.4)	18 (1.3)	83 (5.8)	198 (13.8)	377 (26.3)	392 (27.4)	254 (17.7)	78 (5.5)	19 (1.3)	4 (0.3)		1,431 (100.0)	1,548	2,979	164.47	7.15
総計 (%)	68 (0.1)	39 (0.0)	78 (0.1)	310 (0.3)	1,227 (1.2)	5,397 (5.1)	14,679 (14.0)	27,701 (26.4)	28,279 (26.9)	18,527 (17.7)	6,597 (6.3)	1,737 (1.7)	264 (0.3)	35 (0.0)	104,938 (100.0)	7,577	112,515	164.79	7.22
平均	3.99	4.81	4.59	4.66	4.56	4.55	4.52	4.51	4.51	4.50	4.51	4.46	4.50	4.69	4.51	4.42	4.50		
標準偏差	1.71	1.96	1.78	2.06	1.88	1.71	1.66	1.62	1.61	1.55	1.53	1.48	1.47	1.53	1.61	1.73	1.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査