

表 2359 身長(cm) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	2 (0.2)	3 (0.4)	9 (1.1)	23 (2.8)	80 (9.8)	119 (14.6)	123 (15.1)	160 (19.6)	142 (17.4)	108 (13.2)	30 (3.7)	14 (1.7)	3 (0.4)		816 (100.0)	58	874	160.28	10.02
7.0～ (%)		3 (0.3)	13 (1.1)	35 (3.0)	90 (7.8)	127 (11.0)	178 (15.5)	222 (19.3)	230 (20.0)	178 (15.5)	57 (5.0)	17 (1.5)	1 (0.1)		1,151 (100.0)	115	1,266	161.43	9.49
7.5～ (%)	5 (0.1)	15 (0.3)	32 (0.7)	139 (3.0)	338 (7.4)	589 (12.9)	698 (15.2)	946 (20.7)	882 (19.3)	621 (13.6)	244 (5.3)	61 (1.3)	11 (0.2)		4,581 (100.0)	390	4,971	161.21	9.42
8.0～ (%)	16 (0.1)	38 (0.3)	167 (1.1)	496 (3.3)	1,105 (7.3)	1,827 (12.1)	2,356 (15.7)	3,228 (21.4)	2,967 (19.7)	1,956 (13.0)	667 (4.4)	193 (1.3)	28 (0.2)	7 (0.0)	15,051 (100.0)	1,239	16,290	160.92	9.48
8.4～ (%)	5 (0.1)	13 (0.3)	45 (1.0)	162 (3.7)	334 (7.6)	520 (11.9)	696 (15.9)	912 (20.9)	871 (19.9)	570 (13.0)	176 (4.0)	60 (1.4)	9 (0.2)		4,373 (100.0)	303	4,676	160.90	9.47
8.5～ (%)	56 (0.1)	135 (0.3)	535 (1.1)	1,882 (3.7)	4,071 (8.1)	6,685 (13.3)	8,265 (16.4)	10,541 (21.0)	9,507 (18.9)	5,854 (11.6)	2,136 (4.2)	542 (1.1)	73 (0.1)	16 (0.0)	50,298 (100.0)	3,604	53,902	160.35	9.48
9.0～ (%)	64 (0.1)	168 (0.3)	661 (1.1)	2,427 (4.0)	5,585 (9.1)	8,886 (14.5)	10,151 (16.6)	12,166 (19.9)	10,857 (17.8)	6,880 (11.3)	2,490 (4.1)	644 (1.1)	99 (0.2)	15 (0.0)	61,093 (100.0)	4,143	65,236	159.86	9.59
9.5～ (%)	47 (0.1)	105 (0.3)	445 (1.1)	1,691 (4.3)	3,798 (9.6)	6,068 (15.3)	6,783 (17.1)	7,796 (19.6)	6,658 (16.7)	4,314 (10.8)	1,552 (3.9)	430 (1.1)	70 (0.2)	11 (0.0)	39,768 (100.0)	2,636	42,404	159.54	9.67
10.0～ (%)	4 (0.1)	15 (0.3)	65 (1.3)	200 (4.1)	457 (9.4)	743 (15.2)	855 (17.5)	929 (19.0)	826 (16.9)	542 (11.1)	170 (3.5)	61 (1.2)	13 (0.3)	2 (0.0)	4,882 (100.0)	345	5,227	159.55	9.68
10.1～ (%)	15 (0.1)	32 (0.3)	149 (1.2)	529 (4.3)	1,351 (10.9)	1,936 (15.7)	2,141 (17.3)	2,281 (18.5)	2,094 (17.0)	1,224 (9.9)	461 (3.7)	111 (0.9)	20 (0.2)	2 (0.0)	12,346 (100.0)	931	13,277	159.08	9.67
10.5～ (%)	13 (0.2)	11 (0.2)	69 (1.2)	270 (4.5)	614 (10.3)	987 (16.5)	1,029 (17.2)	1,189 (19.9)	931 (15.6)	600 (10.0)	200 (3.3)	47 (0.8)	14 (0.2)	2 (0.0)	5,976 (100.0)	477	6,453	158.93	9.55
11.0～ (%)	6 (0.3)	4 (0.2)	30 (1.5)	113 (5.7)	254 (12.8)	337 (16.9)	361 (18.1)	378 (19.0)	305 (15.3)	150 (7.5)	46 (2.3)	6 (0.3)	2 (0.1)		1,992 (100.0)	173	2,165	157.52	9.33
11.5～ (%)	1 (0.1)	2 (0.3)	8 (1.2)	35 (5.1)	88 (12.7)	126 (18.2)	113 (16.4)	128 (18.5)	106 (15.3)	51 (7.4)	26 (3.8)	5 (0.7)	2 (0.3)		691 (100.0)	78	769	157.96	9.66
12.0～ (%)		5 (1.1)	8 (1.7)	28 (5.9)	57 (12.1)	79 (16.7)	81 (17.1)	91 (19.2)	69 (14.6)	37 (7.8)	13 (2.7)	5 (1.1)			473 (100.0)	66	539	157.65	9.71
合計 (%)	234 (0.1)	549 (0.3)	2,236 (1.1)	8,030 (3.9)	18,222 (9.0)	29,029 (14.3)	33,830 (16.6)	40,967 (20.1)	36,445 (17.9)	23,085 (11.3)	8,268 (4.1)	2,196 (1.1)	345 (0.2)	55 (0.0)	203,491 (100.0)	14,558	218,049	159.95	9.59
記載なし (%)	3 (0.0)	19 (0.3)	69 (1.1)	253 (3.9)	597 (9.2)	985 (15.2)	1,027 (15.9)	1,291 (20.0)	1,131 (17.5)	742 (11.5)	281 (4.3)	58 (0.9)	6 (0.1)	2 (0.0)	6,464 (100.0)	4,458	10,922	159.85	9.58
総計 (%)	237 (0.1)	568 (0.3)	2,305 (1.1)	8,283 (3.9)	18,819 (9.0)	30,014 (14.3)	34,857 (16.6)	42,258 (20.1)	37,576 (17.9)	23,827 (11.3)	8,549 (4.1)	2,254 (1.1)	351 (0.2)	57 (0.0)	209,955 (100.0)	19,016	228,971	159.94	9.59
平均	9.25	9.19	9.23	9.26	9.26	9.24	9.21	9.16	9.14	9.13	9.13	9.11	9.19	9.14	9.18	9.18	9.18		
標準偏差	0.82	0.77	0.76	0.74	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.71	0.72	0.76	0.63	0.74	0.79	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査